

63,43

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE FLORAIRE

(ANCIEN JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

FONDÉ EN 1884)



H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE

A CHÊNE-BOURG, PRÈS GENÈVE (SUISSE)



CATALOGUE GÉNÉRAL DE PLANTES 1925 1926



Prière de conserver ce catalogue dont nous ne publierons pendant quelques années que des suppléments.

Please keep this catalogue: we shall send in the following years only some supplements to it.

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule les précédents.

Nos ventes ont lieu sous les conditions suivantes :

Expéditions. — Nos marchandises sont livrables à notre établissement et sont expédiées par nos soins, mais aux risques et périls du destinataire. Nos clients voudront donc bien nous donner toutes les indications utiles pour faciliter les envois ; faute de renseignements, nous choisissons le mode d'expédition qui nous paraît le plus avantageux sans cependant prendre de responsabilités.

Les réclamations concernant le transport doivent être adressées au chemin de fer et, en cas de retard dans la livraison, nous conseillons à nos clients de ne retirer leurs colis que sous toutes réserves. Nos factures sont datées du jour de l'expédition.

Emballages. — Sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

Garanties. — Toutes nos plantes sont emballées avec le plus grand soin et sont en pleine santé ; leur reprise dépendant des soins donnés à l'arrivée, préparation du terrain, etc., nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à ce sujet. Nous garantissons l'authenticité des espèces livrées.

Paiements. — Nos factures sont payables au comptant ; passé le délai de 30 jours, nous disposons par traite ou remboursement postal, après avis ; les frais de recouvrement sont à la charge du client.

Correspondances. — Nous prions instamment nos correspondants d'affranchir suffisamment leurs lettres et de donner leur adresse d'une manière très lisible.

Dans la règle nous n'accusons réception que des commandes qui ne peuvent être exécutées dans les deux semaines.

Avis. — Nous rappelons que les conditions spéciales que nous accordons à nos clients de France et de Belgique ne sont valables que pour les personnes domiciliées dans l'un de ces deux pays et pour autant que la marchandise est destinée à être utilisée en France ou en Belgique.

Un franc suisse = 10 pence anglais.

COLLECTIONS DE PLANTES

Les personnes que le choix d'une collection de plantes embarrasse peuvent nous confier ce soin en nous indiquant le genre de plantes désirées d'après la liste ci-dessous :

Plantes pour bordures		Plantes pour abeilles (mellifères)	
»	» lieux secs	»	» officinales
»	» l'ombre	»	» odoriférantes et aromatiques
»	» mi-ombre	»	» formant gazon pour sol sec
»	» talus arides	»	» émailler les gazons
»	» lieux humides	»	» bouquets
»	» murs fleuris	»	» rochers alpins.

Ces collections établies à notre choix sont facturées :

100 espèces plantes	Fr. 60.—
50 » »	30.—
25 » »	15.—
12 » »	7.50

Ces collections sont établies d'après les indications données par le client sur le climat, la nature du sol disponible, l'exposition et le but à atteindre.

Pour les collections à notre choix en Orchidées et Fougères, voir la fin de chaque chapitre correspondant.

COMMANDES IMPORTANTES

Pour les commandes importantes, nous consentons des rabais qui sont établis pour chaque cas particulier.

JARDINISME


Notre *Service d'Architecture paysagère* se charge des études, plans et devis pour la création de jardins alpins ou de tous styles, parcs, construction de rocailles, tennis et golf-links, transformation de propriétés. Direction et surveillance des travaux. Consultations. Tarif d'honoraires le plus réduit.

AVIS

Nous engageons vivement les personnes qui débutent dans la culture des plantes alpines à faire l'acquisition de notre volume : « *Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins* », annoncé ailleurs sous la rubrique : Publications. Cet ouvrage est le *vade-mecum* de l'amateur ; il est aussi indispensable à l'amateur débutant qu'au professionnel.

Explication des Signes et Abréviations

Aq. = Pl. aquatiques	= Waterplants.
Arom. = Pl. aromatiques	= Aromatic plants.
Bo. = Pl. à bordures	= Bording plants.
H. = Pl. d'humidité	= liking wet places.
Med. = Pl. officinales	= Medicinal plants.
Mel. = Pl. mellifères	= For bees.
M. = Pl. pour morraine	= For morraine.
N. = A placer au nord	= For north side.
Pal. = Pour marécage	= Bog plant.
Pr. = Pour prairie alpestre	= For swiss meadow.
R. = Pour rocailles	= For rockery.
S. = Pl. aimant soleil	= For sunny places.
Sp. = Pour Sphagnum	= For Spagnum culture.
T. = Pour tourbière	= For english morraine.
V. = Pl. vivaces décoratives	= Herbaceous borders.
∧ = Délicates, à couvrir l'hiver	= Tender plants.
∨ = Pl. envahissantes	= Invading plants.
/// = Spéciales pour mur ou fentes rochers	= Wallplants.
⊕ = Pour fleur coupée	= For cutflowers.
± = Pl. tapissantes	= Creeping plants.
§ = Pl. grimpante	= Creeper.
= Pl. pour sous-bois	= For wood or shrubunderwood.
× = Pl. de terre de bruyère	= Peat plant.



Plantes alpines, montagnardes et saxatiles

propres à planter dans rocailles et les murs,
en plantes-bandes ou en groupes

et Plantes vivaces pour le jardin d'ornement

Nous donnons peu de descriptions des plantes énumérées, nos clients possédant très généralement notre volume: *Les plantes des montagnes et des rochers*, annoncé à la fin du présent catalogue, ou nos précédents ouvrages.

	Fr. Cts
Acæna argentea	0.75
» Buchananii	0.75
» glabra	0.75
» glauca	0.75
» glaucophylla	0.75
» microphylla	0.75
» Novæ Zelandiæ	0.75
» ovalifolia	0.75
» sanguisorba	0.75
» sarmentosa	0.75
» serica	1.—
Plantes curieuses, naines et rampantes ; merveilleux gazon dans les sous-bois ou les lieux ombragés ; réussissent aussi en plein soleil ; feuill. parfois aussi délicates que frondes Fougères.	
Acantholimon androsaceum	2.50
» Balansæ	2.50
/// Fomini	2.50
/// R » glumaceum	1.50
» graminifolium	2.50
/// » lepturoides	2.50
/// » tenuiflorum	2.50
/// » venustum	1.50
Grand soleil et rochers.	
— Acanthosonchus cervicornis	2.50
Acanthus latifolius	0.75
» arboreus	2.50
» spinosissimus	0.75
A planter au soleil ou au pied d'un mur.	

ACHILLÉES A FLEURS BLANCHES

±	Achillea abrotanoides	1.—
±	» ageratifolia	1.—
///	» alizon	1.—
±	» argentea	0.75
R n	» atrata	1.—
R ///	» clavennæ	1.—
///	» conjuncta	2.50
R	» Fraasii	1.50
R	» Frohmulleri	1.50

± ///	Achillea Grisebachii	1.—
M R	» Herba-Rota	2.50
R n	» Impatiens	0.50
R	» Jaborneggi	1.—
± Bo	» Kellereri	0.75
R	» lingulata	0.50
O R	» macrophylla	1.—
Pr ± R	» millefolium roseum	0.50
M ±	» moschata	1.—
M ±	» nana	2.50
H	» Ptarmica	1.—
	» Ptarmica fl. pl.	0.75
H	» pyrenaica	0.50
R	» Reichardiana	2.50
± R	» rupestris	1.50
/// R	» Saracenica (aromatique)	1.50
± ///	» serbica	0.50
/// ±	» umbellata	0.50
R	» Wilczekii	1.50

ACHILLÉES A FLEURS JAUNE VIF

—	Achillea Ageratum	0.75
± V	» filipendulina	0.75
—	» holosericea	1.—
±	» sericea	0.50
	» sulfurea	0.50
R ±	» tomentosa	0.50

Pl. solides et fleurissant tout l'été ; A. filipendulina est l'une des meilleures pl. pour plates-bandes et bouquets ; A. serica et Ageratum sont excellentes pour la garniture des talus secs et endroits arides.

	Aconitum anthora	0.75
	» cammarum	0.75
	» Forresti	2.50
	» Japonicum	1.50
	» Lycoctonum	0.75
	» Napellus	0.75
	» Napellus à fleurs blanches	1.50
	» paniculatum	0.75

Fr. Cts

Aconitum septentrionale.	1.50
» Sostaricianum	1.50
» variegatum.	0.75
» Vilmorinianum	1.50
» Wilsoni	1.50

Bonnes pl. vivaces pour ombre ou demi-ombre.

Aq Pal. Acorus calamus (roseau aromatique)	0.50
Aq Pal. Acorus calamus fol. var.	1.50
Pa » gramineus	0.50
» »	0.50
O Actæa rubra	1.50
O » spicata.	0.75
R Actinella scaposa	2.50
V Adenophora Bulleyana liliifolia	0.75
» Potanini.	0.75
» stylosa.	0.75
» verticillata.	1.50

Ce sont des campanules propres à garnir les rochers, les plates-bandes et massifs ; fl. lilas ou bleues ; pl. élégantes, hautes de 50 cent. à 1 mètre ; juin-août.

 O Adenostyles albifrons	1.50
R » alpina	1.50
/// » leucophylla	2.50
R S Adonis pyrenaica	1.50
R S Adonis vernalis	0.50

Grandes anémones d'un jaune brillant, à feuillage très finement divisé ; de mars en mai. L'A. vernalis est une superbe espèce facile à cultiver ; c'est l'une des meilleures plantes du premier printemps. Sol profond et léger, grand soleil ; lieux secs.

O Adoxa moschatellina	0.50
± Aegopodium Podagraria, pl. var. panachées.	0.75
/// Aethionema armenum	2.50
/// » antitaurii	1.—
/// » cordatum (<i>Eunomia cordata</i>)	1.—
/// » cordifolium (<i>Iberis jucunda</i>)	2.50
/// » creticum	1.—
/// » Florariense	2.50
/// » grandiflorum	1.—
/// » iberideum, à fl. blanc pur	1.—
/// » ovalifolium	2.50
/// » kotschyi	2.50
/// » oppositifolia	2.50
/// » pulchellum	1.—
/// » pyrenaicum	2.50
/// » rotundifolium	2.50
R /// » saxatile	0.50
/// » schistosum	1.—
/// » stylosa	1.—
/// » Thomasianum	2.50
/// » Warleyensis	2.50

Gracieuses Crucifères aimant le soleil et le sec : toutes excellentes pour rochers.

R Agathea petiolutata	1.—
V Agrostemma (Lychnis) coronaria	0.40
~ Ajuga Genevensis	0.50
R » crispa	1.50
» pyramidalis	1.—
» reptans	0.50

Fr. Cts

Ajuga reptans à fol. var.	0.50
» » à fl. blanches.	0.50
» » à fl. roses.	1.—
» » metallica	0.75

Les Ajuga (Bugles) ont des épis à fl. bleues, très décoratives chez les A. Genevensis et reptans qui sont des espèces envahissantes et très propres à garnir rapidement un talus aride ou un rocher ensoleillé ; sol maigre.

Pr R Alchemilla alpina	0.50
» splendens	0.50
» vulgaris	0.50
Aq Alisma Plantago (Plantain d'eau)	0.50
V Alkanna orientalis	0.75
R Allium moly, fl. jaunes	0.50
R Allium giganteum	2.50
R » pedemontanum, fl. roses	1.50
O » Ursinum, pour les sous-bois	0.50
R » Valdense, fl. carmin.	0.50
R » Victorialis	0.50
Med R » Alopecurus lanatus	2.50

Alsine, voir *Arenaria*.

Alstroemeria hybrida 1.—

Med Althæa officinalis (Guimauve)	0.75
» rosea (Rose-trémière) à fl. simples. Pl. décoratives de gd effet.	0.75
» Fl. doubles.	1.50

R /// Alyssum argenteum	0.50
/// » alpestre	1.—
/// » Arduini	0.75
R /// » Gemonense	1.—
/// » halimifolium, fl. blanches	1.—
/// » macrocarpum	1.—
/// » maritimum	0.50
/// » Moellendorffianum	1.—
/// » montanum	0.75
/// » pyrenaicum	2.50
/// » repens	1.50
/// » rostratum	0.50
/// » rupestre	2.50
R Bo /// » saxatile (Corbeille d'or)	0.50
» » compactum	1.—
» » fol. var.	1.—
» » fl. pl.	1.—
» » citrinum	0.75

R » serpyllifolium	1.50
/// » speciosum	0.75
/// Alyssum spinosum	0.75
/// » » roseum	2.50
R » tortuosum	2.50
/// » transylvanicum	0.75
R » Wiersbickii	0.50
/// » Wulfenianum	1.—

Crucifères rampantes ou en buisson, aux nombreuses fl. jaunes ou blanches ; soleil, avril-juin. Toutes sont bonnes pour rochers.

Amaryllis Belladonna	2.50
» Sternbergia, lutea	0.50
§ Ampelopsis muralis	1.—
§ » Veitchii	1.50
R S Amphicome arguta	2.50

Belle pl. vivace himalayenne et rare, voisine des Incarvillea ; fl. rose tendre.

	Fr. Cts
R <i>Amphyrapis albescens</i>	1.—
R <i>Amsonia Tabernæmontana</i>	1.—
R <i>Anacyclus formosus</i>	2.50
R <i>Anagallis linifolia</i>	1.50
R S » <i>tenella</i> (rouge brique).	1.50
V <i>Anaphalis Jezoensis</i>	0.75
V » <i>Margaritacea</i>	0.75

Immortelles blanches vivaces.

V <i>Anchusa italica</i>	0.75
+ <i>Anchusa italica</i> <i>Droptmore</i>	0.75
+ » » <i>Opale</i>	0.75
+ » <i>myosotidiflora</i>	1.50
+ » <i>sempervirens</i>	1.—

Grandes Bourraches à fl. d'un bleu superbe; pl. de grand effet et hautement décoratives, produit, surtout chez *Droptmoreana*, des masses de fl. bleu intense. Culture facile.

R <i>Andrachne colchica</i>	2.50
+ » <i>telephiifolia</i>	0.75
× <i>Andromeda japonica</i>	5.—
× Pa » <i>polifolia</i>	1.50

ANDROSACES, GROUPE DES ESPÈCES TERRESTRES

/// <i>Androsace arachnoidea</i>	2.50
R » <i>albana</i>	2.50
R » <i>Brigantiaca</i>	1.50
R » <i>carnea</i>	1.—
/// R » <i>Chamæjasme</i>	1.—
R » <i>Chaixii</i>	1.50
R » <i>Chumbyi</i>	1.50
R /// » <i>coccinea</i>	2.50
R » <i>foliosa</i>	1.50
R » <i>Halleri</i>	1.50
R /// » <i>lactea</i>	1.50
R » <i>lactiflora</i>	0.50
/// R » <i>lævigata</i>	2.50
R » <i>Laggeri</i>	1.—
+ R » <i>lanuginosa</i>	1.50
R <i>Androsace obtusifolia</i>	0.75
+ R » <i>oculata</i>	0.75
R » <i>primuloides</i>	1.—
+ R » <i>sarmentosa</i>	0.75
R » <i>sempervivoides</i>	1.—
R » <i>spinosissima</i>	2.50
/// R » <i>villosa</i>	0.75
+ R » <i>Watkinsii</i>	1.—

Soleil, sol pierreux et sableux, bonne niche dans la rocaille. Les *A. foliosa*, *lanuginosa*, *oculata* et *sarmentosa* (himalayennes) sont plus particulièrement robustes et vigoureuses et fleurissent abondamment de juin en octobre-novembre. On peut les cultiver en pleine terre.

SAXATILES

/// <i>Androsace Charpentieri</i>	2.50
/// » <i>ciliata</i>	1.50
/// » <i>cylindrica</i>	2.50
/// R » <i>glacialis</i>	1.50
/// » <i>Hausmanni</i>	2.50
/// R » <i>Hedraantha</i>	1.50
/// » <i>Helvetica</i>	2.50
/// » <i>imbricata</i>	2.50
/// » <i>Pacheri</i>	2.50

/// R <i>Androsace Prætutiana</i>	2.50
/// » <i>pubescens</i>	2.50
/// » <i>pyrenaica</i>	2.50
/// R » <i>vitaliana</i>	0.75
/// » <i>Wulfeniana</i>	2.50

Fente de muraille ou de rocaille au levant ou au couchant, pas de terre (ou seulement un composé de cailloux et de sable si l'on veut les cultiver en pots ou moraine. Eviter la pourriture. *A. vitaliana* est de culture aisée et va dans tous les lieux ensoleillés. Elle anime le sol de ses fl. jaune vif de mars en mai.

R <i>Andryalla Aghardi</i>	1.—
--------------------------------------	-----

ANÉMONES. GROUPE *Hepatica*

Anemone <i>angulosa</i>	0.75
» <i>Hepatica</i>	0.50
» » variétés à fl. roses, rose vif, lilas cl. et blanches	0.75
» » var. fl. pl. rose	1.—
» » var. fl. pl. bleu foncé	1.50
» <i>transylvanica</i>	1.50

Bonnes pl. à bordures ou pour émailler les taillis; ombre ou soleil; fleur. mars-avril.

GROUPE *Pulsatilla*

Anemone <i>albana</i>	1.50
» <i>alpina</i>	2.50
» <i>armena</i>	2.50
» <i>Georgica</i>	2.50
» <i>Halleri</i>	2.50
» <i>montana</i>	1.50
» <i>pratensis</i>	0.75
» » var. <i>nigricans</i>	1.—
» <i>propera</i>	2.50
» <i>Pulsatilla</i>	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » <i>hybrida</i>	2.50
» <i>Regeliana</i>	2.50
» <i>rubra</i>	1.50
» <i>sulfurea</i>	2.50
» <i>vernalis</i>	0.75

Sol riche en humus et soleil; plate-bande ou rocaille.

ANÉMONES DIVERSES

O R <i>Anemone apennina</i>	0.50
R » <i>Baikalense</i>	1.—
/// R » <i>Baldensis</i>	1.—
R » <i>blanda</i>	0.50
R » <i>caucasica</i>	2.50
R » <i>chinensis</i>	2.50
R » <i>decapetala</i>	0.75
R » <i>demissa</i>	2.50
+ + » <i>dichotoma (pennsylvanica)</i>	0.75
V + » <i>elegans</i>	0.75
R » <i>flaccida</i>	2.50
R » <i>hupensis</i>	2.50
R » <i>intermedia</i>	2.50
V + » <i>Japonica</i>	0.75
» » <i>alba</i>	0.75
» » à fl. doubles	1.50
» » à grandes fleurs	1.50

	Fr. Cts		Fr. Cts
R <i>Anemone Lavallei</i>	2.—	<i>Aquilegia canadensis</i>	0.75
R » <i>magellanica</i>	0.75	» <i>chrysantha</i>	0.75
R » <i>multifida</i>	0.75	» <i>cœrulea</i>	0.75
R » <i>narcissiflora</i>	0.75	/// » <i>Einseleana</i>	1.50
O R » <i>nemorosa</i> (la sylvie des bois)	0.50	» <i>flabellata</i>	1.50
» » à fl. rose carmin	1.—	» <i>flavescens</i>	1.50
» » <i>monstrosa</i>	1.—	» <i>formosa</i>	2.50
» » à fl. doubles	1.—	× » <i>glandulosa vera</i>	2.50
S R » <i>palmata</i>	1.50	/// » <i>grata</i>	1.50
H » <i>ranunculoides</i>	0.50	» <i>Haylodgensis</i>	1.—
R » <i>riparia</i>	1.—	» <i>Helenæ</i>	1.—
R H » <i>rivularis</i>	1.—	» <i>hybrida</i>	0.75
R » <i>Robinsoniana</i>	1.—	» <i>nigricans</i>	0.75
R » <i>rupicola</i>	2.50	» <i>nivea</i>	0.75
+ O » <i>sylvestris</i>	0.75	» <i>olympica</i>	1.—
O » <i>trifoliata</i>	0.75	» <i>oxysepala</i>	2.50
R » <i>villosissima</i>	2.50	» <i>pyrenaica</i>	1.—
R » <i>vitifolia</i> (voisin de Japonica)	1.—	» <i>Skinneri</i>	1.—
O × <i>Anemonopsis macrophylla</i>	2.50	» <i>Reuteri</i>	1.50
V R <i>Anomatheca cruenta</i>	1.50	» <i>transylvanica</i>	1.—
<i>Antennaria alpina</i>	0.75	» <i>viridiflora</i>	2.50
» <i>carpathica</i>	1.—	» <i>Ulepitchii</i>	1.50
» <i>dioica</i> , <i>Immortelle rose</i>	0.75	Pr » <i>vulgaris</i>	0.50
» <i>plantaginea</i>	0.75		
» <i>triplinervis</i>	0.75		
Pl. basses et gazonnantes, au feuillage gris cendré, aux petites fl. immortelles, roses ou blanches; R. S. //.		Les Ancolies sont d'entre les meil. pl. du printemps ; cult. facile ; mi-ombre ou sous-bois, rocaille, pl. terre, même au soleil. Les <i>A. alpina</i> , Bertoloni, <i>cœrulea</i> , <i>lactiflora</i> , <i>pyrenaica</i> , <i>grandulosa</i> , <i>thal-</i> <i>ictrifolia</i> et <i>transylvanica</i> , plus délicates, exigent la rocaille ou milieu frais, mi-ombre, un sol poreux et bien drainé. Toutes fleurissent abondamment et sont très gracieuses et ornementales.	
R <i>Anthemis ammanensis</i>	2.50	+ Bo <i>Arabis albida</i> . <i>Corbeille d'argent</i>	0.50
R » <i>cinerea</i>	0.75	» » fl. pl.	0.50
R » <i>montana</i>	1.—	Bo » <i>alpina</i>	0.50
Med » <i>nobilis</i> (camomille rom. vr.)	0.50	» » à feuilles panachées	0.50
R » <i>rigescens</i>	0.50	» » <i>grandiflora</i> , fl. rosea	1.—
/// R » <i>tinctoria</i> (jaune d'or).	0.50	» » <i>superbissima</i>	1.50
<i>Anthericum Liliago</i>	0.50	/// » <i>androsacea</i>	1.—
» » » var. <i>major</i>	1.—	/// » <i>arenosa</i>	0.50
» <i>ramosum</i> (Lis des rochers)	0.75	/// » <i>aubrietoides</i>	1.—
Ce sont des Liliacées à fl. blanches, très nombreuses chez <i>ramosum</i> , qui est très recommandable ; soleil. Pleine terre ou rochers.		Pa » <i>bellidifolia</i>	0.75
R ± <i>Anthyllis montana</i>	0.75	/// » <i>bryoides</i>	1.—
» » » var. <i>car-</i>		/// » <i>carduchorum</i> (<i>Draba Gyg.</i>)	1.—
» » » <i>minea</i>	1.50	/// Bo » <i>caucasica</i>	1.—
Très belle pl. à feuil. grisâtre, à fl. rose vif, très odorantes ; rochers ou pl. terre, soleil.		M R » <i>cœrulea</i>	2.50
/// S <i>Antirrhinum asarina</i>	1.—	/// » <i>Ferdinand-Coburgi</i>	1.—
/// S » <i>glutinosum</i>	1.—	R » <i>Halleri</i>	1.—
/// » <i>majus</i> (Gueule-de-loup)	0.50	R » <i>Kellereri</i>	0.75
/// » <i>sempervirens</i>	1.—	R » <i>lucida</i> fol. var.	1.—
/// » » var. <i>roseum</i>	1.—	/// » <i>ovirens</i>	1.—
/// » <i>tortuosum</i>	1.50	/// » <i>procurrens</i>	0.75
Fentes des rochers ou murs ; soleil.		R » <i>purpurascens</i>	1.50
R S <i>Aphyllantes monspelliensis</i>	1.50	/// » <i>rosea</i> (rose)	0.75
§ <i>Apios tuberosa</i>	1.50	/// » <i>scopoliana</i>	0.75
Aq <i>Aponogeton distachium</i>	1.50	/// » <i>Stelleri</i>	0.75
O <i>Aposeris fœtida</i> (<i>Hyoseris fœtida</i>)	0.50	/// » <i>versicolor</i>	0.75
<i>Aquilegia alpina</i>	1.50	/// » <i>Vochinensis</i>	0.75
» <i>alpina superba</i>	2.50	R <i>Arctostaphylos alpina</i>	2.50
» <i>arctica</i>	2.50	R ± » <i>nevadensis</i>	2.50
» <i>atropurpurea</i>	1.50	R ± » <i>Uva Ursi</i> . <i>Raisin d'ours</i>	1.50
» <i>atrata</i>	0.75	<i>Arenaria armeriastum</i>	0.50
/// » <i>Bertoloni</i>	1.50	» <i>austriaca</i>	0.50
» <i>californica</i>	1.—	» <i>balearica</i>	0.50
		» <i>Bauhinorum</i>	0.50

	Fr. Cts
<i>Arenaria Bertoloni</i>	0.50
» <i>cæspitosa</i>	0.50
» <i>capitata</i>	0.50
» <i>cerastiifolia</i>	0.50
» <i>ciliata</i>	0.50
» <i>Fendleri</i>	0.50
» <i>foliosa</i>	0.50
» <i>frigida</i>	0.50
» <i>Gerardi</i>	0.50
» <i>glandulosa</i>	0.50
» <i>gracilis</i>	0.50
» <i>graminifolia</i>	0.50
» <i>grandiflora</i>	0.50
» <i>juniperina</i>	0.50
» <i>lanceolata</i>	0.50
» <i>laricifolia</i>	0.50
» <i>liniflora</i>	0.50
» <i>montana</i>	0.50
» » <i>grandiflora</i>	0.50
» <i>mucronata</i>	0.50
» <i>nardiflora</i>	0.50
» <i>pinifolia</i>	0.50
» <i>purpurascens</i>	0.50
» <i>recurva</i>	0.50
» <i>rigida</i>	0.50
» <i>Rosani</i>	0.50
» <i>Sajanensis</i>	0.50
» <i>saxatilis</i>	0.50
» <i>steveniana</i>	0.50
» <i>stygia</i>	0.75
» <i>tetraquetra</i>	0.50
» <i>verna</i>	0.50
» <i>Villarsii</i>	0.50

Les *Arenaria* ou *Alsine* sont de petites pl. gazonnantes, tapissant le sol et reproduisant une infinité de fleurs blanches (roses chez *purpurascens*); on les nomme parfois *mousse fleurie*; mai-juillet, soleil. La presque totalité sont bonnes pour le mur ou la rocaille.

R	<i>Arisarum vulgare</i>	2.50
§	<i>Aristolochia altissima</i>	2.50
~	» <i>longa</i>	2.50
~	» <i>Pistolochia</i>	2.50
R	» <i>rotunda</i>	2.50
~	» <i>clematitis</i>	0.50
R	<i>Armeria alpina</i>	0.75
///	» <i>cæspitosa</i>	2.50
R	» <i>Halleri</i>	0.75
R	» <i>majellensis</i>	0.75
R	» <i>plantaginea</i>	0.75
Bo	» <i>vulgaris</i> , <i>Gazon d'Olympe</i>	0.50
R	» <i>vulgaris</i> , <i>alba</i>	1.—
R	» <i>welwitschii</i>	0.75

Pl. basses et gazonn. à fl. rose plus ou moins vif en capitules serrés. Soleil : été.

R	<i>Arnebia echioides</i>	2.50
×	<i>Arnica montana</i>	1.50

Sol poreux et riche en humus.

R O	<i>Aronicum scorpioides</i>	1.50
R	<i>Artemisia abrotanum</i>	1.50
~ R	» <i>arborescens</i>	2.50
Med R	» <i>Absinthium</i>	0.50
/'	» <i>atrata</i>	2.50

R +	<i>Artemisia austriaca</i>	1.50
R	» <i>camphorata</i>	1.—
///	» <i>caucasica</i>	2.50
R +	» <i>cœrulescens</i>	2.50
+ R	» <i>gallica</i>	1.50
///	» <i>glacialis</i>	1.50
~ R	» <i>glauca</i>	1.50
+ R	» <i>granatensis</i>	1.50
R	» <i>lactiflora</i>	1.50
R S	» <i>maritima</i>	1.50
R ///	» <i>Muëllinum</i> , <i>faux Génipi</i>	1.50
R	» <i>pedemontana</i>	1.50
~ R	» <i>Pontica</i>	1.—
/// R	» <i>Roezli</i>	1.50
~ +	» <i>rupestris</i>	1.—
R /	» <i>spicata</i> , <i>vrai Génipi</i>	1.50
R +	» <i>Stelleriana</i>	1.50
R	» <i>suavis</i>	1.50
R	» <i>tridentata</i>	2.50
///	» <i>Valesiaca</i> (à odeur très forte)	1.—
R	» <i>Villarsii</i>	1.50

Les *Artemises* ou *Armoises*, sont de gracieuses composées fortement aromatiques, dont plusieurs très appréciées en pharmacie. Le vrai Génipi est la plus réputée; mais sa culture est difficile et son congénère *A. mutel.*, qui en diffère peu quant aux qualités et offre le même aspect, lui est généralement préféré dans les rocailles. Soleil; sol sableux et caillouteux, profond, bien drainé.

R S	<i>Arum Dracunculus</i> (<i>Serpentaire</i>)	0.50
O	<i>Arum italicum</i>	0.50
R	» <i>proboseideum</i>	1.—
V	<i>Arundo Donax</i>	1.—
~ O	<i>Asarum canadense</i>	0.75
~ O	» <i>europæum</i>	0.50

Excellentes pour l'ombre; beau feuillage; plantes naines et touffues, propres à former un tapis de verdure dans les pentes des rocailles tournées au nord. L'*A. europæum* forme de très jolis sous-bois; c'est l'une des meill. pl. d'ombre. Racines fortement aromatiques. **Bo.**

V	<i>Asclepias cornuti</i> (pl. aux oiseaux)	1.—
R V	» <i>tuberosa</i> , l'une des meill. pl. vivaces; jaune orangé vif.	1.50
~	<i>Asparagus acutifolius</i>	2.50
R	» <i>tenuifolius</i>	1.50
///	<i>Asperula athoa</i> , (<i>suberosa</i>)	1.50
R ///	» <i>cynanchina</i>	0.75
///	» <i>hirta</i>	0.75
///	» <i>nitida</i>	0.75
O	» <i>odorata</i> (<i>Waldmeister</i>)	0.50
R	» <i>rigida</i>	0.75
O	» <i>Taurina</i> (pl. d'ombre)	1.—
	L' <i>A. odorata</i> est l'une des meill. pl. pour sous-bois; aromatique.-méd.	
V	<i>Asphodelina cretica</i>	1.50
V	» <i>lutea</i>	1.50
V	<i>Asphodelus albus</i>	1.50
R Bo	<i>Aster alpinus</i>	0.75
	» » à fl. blanches	1.—
	» » à fl. roses	1.—
	» » <i>v. Himalayensis</i>	1.—
	» » <i>v. speciosus</i>	1.—

		Fr. Cts
R	<i>Aster amellus</i>	0.50
	» » vars. Six ou sept belles var. hortic. avec noms à	1.—
V	» <i>Bessarabicus</i> (Ibericus)	1.—
V	» <i>cordifolius</i>	0.75
Bo ±	» <i>diplostephioides</i>	0.75
V	» <i>ericoides</i>	0.75
V	» <i>floribundus</i>	0.75
R	» <i>Garibaldii</i>	2.50
R	» <i>graminifolius</i>	1.50
V	» <i>horizontalis</i>	0.75
V	» <i>lævis</i>	0.75
V	» <i>novæ Angliæ</i>	0.75
V	» » <i>Belgii</i>	0.75
	» » » <i>albus</i>	1.—
R	» <i>Porteri</i>	1.—
V R	» <i>Parmicoides</i>	1.—
V	» <i>roseus</i>	0.50
R	» <i>sericeus</i>	1.—
V	» <i>versicolor</i>	0.75
R	» <i>Yunnanense</i>	1.50

Tous les Asters sont des pl. solides et de pl. terre,
aimant le soleil et fleurissant abondamment,
surtout à l'arrière-automne.

R	<i>Asterolynosyris</i> Willmöttiæ	1.50
R	<i>Astille Davidii</i> (très belle spirée à fl. roses en panicules dressée)	1.50
P2	<i>Astilbe rivularis</i>	1.—
R	<i>Astragalus alopecuroides</i>	1.50
///	» <i>alpinus</i> . <i>Phaca astragalina</i>	1.50
///	» <i>aristatus</i>	2.50
R	» <i>depressus</i>	1.50
/// R	» <i>exscapus</i>	2.50
/// R	» <i>massiliense</i> (<i>Tragacantha</i>)	2.50
/// R	» <i>monspessullanus</i>	1.50
+ R	» <i>Onobrychis</i>	1.50
Pr H O	<i>Astrantia major</i>	0.75
R	» » à fl. roses	1.—
	» » <i>minor</i>	2.50
///	<i>Atamanthe cretensis</i>	1.—
///	» <i>Matthioli</i>	1.—
R	<i>Atraphaxis lanceolata</i>	1.50
O	<i>Atropa Belladonna</i> . (<i>Belladone</i>)	1.—
	<i>Aubrietia antilibani</i>	0.70
	» <i>Columnæ</i>	0.75
	» » fol. var.	0.75
	» <i>creatica</i>	0.75
	» <i>deltoidea</i>	0.75
	» » <i>Fire King</i>	0.75
	» » <i>grandiflora</i>	0.75
	» » <i>Lloyd Edwards</i>	0.75
	» » <i>Mørheimi</i>	0.75
	» » <i>Pritchardi</i>	0.75
	» » <i>purple robe</i>	0.75
	» <i>erubescens</i>	0.75
	» <i>Eyrîi</i>	0.75
	» <i>græca</i>	0.75
	» <i>Hendersonni</i>	0.75
	» <i>Kotschyana</i>	0.75
	» <i>Leichtlini</i>	0.75
	» <i>libanotica</i>	0.75
	» <i>Olympica</i>	0.75

	Fr. Cts
<i>Aubrietia purpurea</i>	0.75
» <i>Pinardi</i>	0.75
» <i>Tauricola</i>	0.75

Jolies petites crucifères aux innombrables fl. acaules,
violette, roses, lilas, etc., formant des touffes
compactes recouvertes, de mars en juin, de fleurs.
Soleil. Excellentes pour murailles, fentes des
rochers, bordures et talus secs. Ce sont des pl.
très précieuses pour le printemps et qui sont
indispensables à l'animation des rochers ou des
jardins de mars en mai.

R × <i>Azalea</i> (<i>Loiseleuria</i>) <i>procumbens</i>	2.50
--	------

Petite azalée des hautes Alpes, où elle tapisse
les rochers granitiques de ses innombrables fl.
d'un rose intense; terre non calcaire, soleil.

/// O	<i>Ballota spinosa</i>	1.—
///	<i>Banffia petraea</i>	1.50
R	<i>Barbarea rupicola</i>	0.75
R	» <i>vulgaris</i> fol. vari.	0.75
V	<i>Baptisia australis</i>	1.50
H	<i>Bellidiastrum Micheli</i>	0.75
/// R	<i>Bellis cœrulescens</i> , <i>Pâquerette</i> <i>bleue</i>	1.—
R	» <i>mexicana</i>	1.—
R	» <i>sylvestris</i>	0.75
// R	<i>Bellium bellicoides</i>	0.75
///	» <i>crassifolium</i>	0.75
/// R	<i>Berardia subacaulis</i>	2.50

Rarissime et curieuse plante des Alpes françaises.

V	<i>Berkheya purpurea</i>	1.50
R	<i>Betonica alopecuroides</i>	0.75
V R	» <i>grandiflora</i> , grandes fl. vio- iolettes. <i>Caucase</i>	0.75
V K	« <i>grandiflora</i> , var <i>superba</i>	1.—
	» <i>officinalis</i>	0.75
R ///	<i>Biscutella coronopifolia</i>	0.75
R ///	» <i>lævigata</i>	0.75
/// R	» <i>lucida</i>	0.75
R	<i>Blitum Virgatum</i>	0.50
V	<i>Bocconia cordata</i>	1.—
V	» <i>microcarpa</i>	1.—
V	<i>Boltonia latisquama</i>	0.75

Sorte de haut Aster aux myriades de fleurs rose
lilas. Sept.-nov.

O R	<i>Borago laxiflora</i>	1.50
O	» <i>orientalis</i>	0.50
~	<i>Bovîæa volubilis</i>	2.50
O	<i>Boykinia aconitifolia</i>	2.50
O	» <i>major</i>	2.50
O	» <i>rotundifolia</i>	2.50
/// R	<i>Brassica repanda</i>	1.50
R	<i>Bulbocodium vernum</i>	0.75
V	<i>Buphtalmum grandiflorum</i>	0.50
/// N	» <i>speciosissimum</i> (<i>Telekia spe- ciosissima</i>)	2.50
R	<i>Bupleurum falcatum</i>	1.—
R	» <i>ranunculoides</i>	0.50
Aq Pa	<i>Butomus umbellatus</i> (<i>Jonc fleuri</i>)	1.—
	<i>Cacalia</i> : Voir <i>Senecio</i> .	
± R	<i>Caccinia glauca</i>	1.—
R	<i>Cachrys lævigata</i>	1.50
~ R	<i>Calocephalus</i> (<i>Leucophyta</i>) <i>Browni</i>	2.50
R	<i>Calamintha Aeynos</i>	1.—
R	» <i>grandiflora</i>	1.50

		Fr. Cts
Aq	<i>Calla palustris</i>	1.50
Pa	<i>Caltha palustris</i> (<i>Populage</i>)	0.75
Pa	» » à fleurs pleines	1.—
Pa	» leptosepala à fleurs blanches	2.50
Pa	» polysepala (esp. géante)	2.50
§	<i>Calystegia dahurica</i> (<i>Liseron</i> <i>rose</i>)	0.75
§	» pubescens fl. pleno	0.75
§	» sepium rosea	2.50
+	» <i>Soldanella</i>	2.50
R	<i>Camassia esculenta</i>	0.50

CAMPANULES

I. — ESPÈCES PUREMENT ALPINES BASSES
OU TRAINANTES :

/// R	<i>Campanula Allioni</i>	1.50
R	» <i>alpina</i>	2.50
R ///	» <i>Ardonensis</i>	2.50
R ///	» <i>argunensis</i>	2.50
R ///	» <i>aucheri</i>	2.50
R Pr.	» <i>barbata</i>	1.—
///	» <i>bellidifolia</i>	2.50
R ///	» <i>cæspitosa</i>	0.75
	» » var. <i>cochlearifo-</i> <i>lia</i>	1.—
R ///	» <i>carnica</i>	2.50
+ R Bo	» <i>carpathica</i>	0.50
	» » <i>alba</i>	0.50
	» » <i>compacta</i>	1.—
	» » var. <i>Riverslea</i>	1.—
	» » <i>white Star</i>	1.—
M ///	» <i>cenisia</i>	2.50
R	» <i>collina</i>	1.—
///	» <i>crispa</i>	2.50
R	» <i>cristallocalyx</i>	1.50
/// n	» <i>Elatines</i>	2.50
///	» <i>Elatinoides</i>	2.50
M ///	» <i>excisa</i>	2.50
///	» <i>fenestrella</i>	2.50
///	» <i>flexuosa</i>	2.50
~	» <i>fragilis</i>	2.50
R ///	» <i>garganica</i>	1.—
	» » <i>hirsuta</i>	2.50
	» » à fleurs blanches	2.50
	» <i>glomerata acaulis</i>	1.50
× T	» <i>hederacea</i> , (<i>Wahlenbergia</i> <i>hederacea</i>)	2.50
R	» <i>istriaca</i>	2.50
R	» <i>Kolenatiana</i>	2.50
R	» <i>lactiflora</i>	1.—
///	» <i>lanata</i> (<i>velutina</i>)	2.50
R	» <i>linifolia</i>	2.50
///	» <i>macrorrhiza</i>	2.50
R	» <i>montana</i>	2.50
///	» <i>mirabilis</i>	1.50
///	» <i>Morettiana</i>	5.—
///	» <i>muralis</i> , (<i>Portenschlagiana</i>)	1.—
	» » <i>major</i>	1.—
R	» <i>nitida</i>	2.50
/// R	» <i>pelviformis</i>	1.50
///	» <i>petraea</i>	2.50
	» <i>Portenschlagiana</i> , v. <i>muralis</i>	

		Fr. Cts
R ///	<i>Campanula pulloides</i>	2.50
R ///	» <i>pulla</i>	1.50
R ///	» <i>pusilla</i>	0.75
	» » à fleurs blanches	1.—
R ///	» <i>Raddeana</i>	1.—
///	» <i>Raineri</i> vraie (très belle es- pèce des Alpes lombardes)	2.50
R	» <i>Rhomboidalis</i>	1.—
	» » à fleurs blan.	1.50
+ R	» <i>rotundifolia</i>	0.75
	» » <i>alba</i>	2.50
	» » à fleurs pleines	2.50
	» » <i>suffruticosa</i>	2.50
R	» <i>sarmatica</i>	0.75
R ///	» <i>Saxifraga</i>	1.50
R	» <i>Scheuchzeri</i>	1.50
	» » à fleurs blanc.	2.50
R ///	» <i>speciosa</i>	0.75
R	» <i>Stansfieldii</i>	1.—
///	» <i>stenocodon</i>	2.50
R	» <i>Steveni</i>	1.—
///	» <i>Tenorii</i>	2.50
R ///	» <i>thyrsoidaea</i> à fl. jaunes, odo- rantes	0.50
///	» <i>Tommasiniana</i>	2.50
R ///	» <i>tridentata</i>	1.50
R	» <i>turbinata</i>	0.75
///	» <i>tyrolensis</i>	1.—
R ///	» <i>Valdensis</i>	2.50
///	» <i>Vanneri</i>	2.50
///	» <i>Venzloi</i>	2.50
R ///	» <i>Waldsteiniana</i>	2.50
///	» <i>Willmotti</i>	2.50
M ///	» <i>Zoyzii</i>	2.50

II. — CAMPANULES MONTAGNARDES, DES RÉGIONS
INFÉRIEURES OU DES BOIS, PROPRES À ORNER LA
PLEINES TERRE OU LES GRANDES ROCAILLES.

R	<i>Campanules Abietina</i>	1.—
+ V	» <i>Alliariaefolia</i> , gr. fl. bl. sur tiges penchées	0.50
R	» <i>dahurica</i>	1.—
R +	» <i>eriocarpa</i> (très belles et gran- des fleurs lilas)	1.—
R	» <i>glomerata</i> (violet foncé)	0.75
	» » à fleurs blanches	1.50
	» » <i>nana</i>	1.50
R	» <i>imeritina</i>	0.75
O R	» <i>latifolia</i>	0.75
	» » à fleurs blanches	1.50
V	» <i>latiloba</i> (<i>grandis</i>)	0.75
V	» <i>macrantha</i>	1.50
R	» <i>Michauxioides</i>	1.—
V	» <i>Mærheimii</i>	1.—
R	» <i>Muretti</i>	1.—
R V	» <i>persicifolia</i>	0.50
	» » à fleurs blanches	1.—
R	» <i>phytidocalyx</i>	1.50
~	» <i>primulaefolia</i>	1.50
R	» <i>punctata</i>	1.—
/// R	» <i>pyramidalis</i>	0.50
	» » à fleurs blanch.	1.—

	Fr. Cts
R Campanules Rapunculoides.	1.—
R » » grandiflora	1.—
R » » sibirica	1.—
V R » <i>Trachelium</i>	0.75
» » à fleurs plein.	1.50
» » » blanc.	1.50
R » urticifolia	0.75

Les espèces les plus robustes et élevées sont :
Alliariaefolia, *erica*, *latif.*, *latiloba*, *macrantha*,
rapunculoides et *trachelium*. Le *C. pyramidalis*
est une pl. hautement décorative et qui porte,
en de longs épis dressés, des myriades de fleurs
lilas clair ; hauteur 1 à 1 m. ½ suivant la cult. juil-
let en novembre, soleil, pleine terre, vieux murs,
rochers, etc.

S ~ Camphorosma monspeliaca.	2.50
H Cardamine asarifolia	0.75
R » » glauca.	2.50
H Pa » pratensis.	0.50
» » à fl. doubles	1.—
O » savensis	2.50
O » trifolia.	1.50
Pr. Carduus defloratus, <i>Chardon car-</i> <i>min.</i>	1.—
Pr. » nutans.	1.—
/// Carduncellus monspeliensis.	2.50
+ O Carex alba	0.50
H » Baldensis	1.50
H » Buchanani, à verdure brune	1.50
Pa » Grayi	1.—
Pa » stricta.	1.—
R Carlina acanthifolia	1.50
R » acaulis (<i>Chardon d'argent</i>)	1.50
R » cynara (<i>Chardon d'or</i>)	2.50

Le Chardon d'argent anime à l'automne les pâtu-
rages de ses grands capitules bordés de ligules
blanches et luisantes ; la fl. peut être conservée
pour l'hiver. Sol profond ; soleil. Les *C. acan-*
thifolia et *cynara* sont les plus grands, leur capi-
tule mesure parfois 10 cm. de diamètre.

R Caryopteris Mastacanthus	1.50
S Catananche cœrulea	0.75
~ Cedronella triphylla	2.50
V Centaurea alpina	2.50
V » » <i>Babylonica</i> , pl. géante à fl. jaune vif	1.50
R » » dealbata.	1.—
R » » Lugdunensis	1.—
V » » macrocephala.	1.—
R O » » <i>montana</i>	0.50
» » à fleurs blanches.	1.—
» » » jaunât.	1.—
» » » roses	1.—
S » » orientalis	1.—
R » » ruthenica	1.50
R /// Centranthus angustifolius	1.—
/// V » » <i>ruber</i> (valériane des murs)	0.50
» » à fleurs blanches	0.50
» » » rouge foncé	0.50

L'une des meilleures pl. murales. On en possède
de trois couleurs (rouge très vif, rose et blanc)
et il fait merveille sur les rochers arides, dans
les vieux murs, sur les talus pierreux, au grand
soleil. Fleurit de mai en novembre.

R Centranthus Velenowskyi.	1.50
------------------------------------	------

	Fr. Cts
R V Cephalaria alpina	1.—
R V » » leucantha	1.—
R » » Uralensis	1.50
Cerastium argenteum	0.50
» » glaciale	2.50
» » lanatum.	1.—
» » strictum.	0.50
» » pyrenaicum	0.50
» » tomentosum	0.50
» » villosum.	0.50

Pl. rampantes, à feuillage grisâtre, souvent argenté,
à très nombreuses fl. blanches, en étoiles ; mai-juil-
let. Toutes sont bonnes pour les murs, les pentes
arides ou les bordures.

R Ceratostigma Willmottiae	2.50
Pr R Cerinthe alpina.	0.75
/// Chaenorhynchum glareosum	2.50
+ V R Cheiranthus allionii.	0.50
/// R » » Cheiri (viollier ou muret)	0.50
R » » Kewensis	1.50
R » » mutabilis	1.50
R » » linifolius	1.50

Ce sont les Violliers odorants dont l'*Allionii* est le
plus merveilleux ; *linifolius* est à fl. violettes.

V + Chelone barbata	0.75
C'est l'une des plus brillantes d'entre les pl. vivaces ; fl. cardinal vif, de juillet-novembre.	
V Chelone barbata imberbis	1.50
» » obliqua	1.50
» » » alba	1.50
/// Cherleria (alsine) sedoides	1.50
Pr R Chionodoxa Luciliae	0.50
Pr R Chicorium Intybus, à fl. bleu azur	0.75
~ Chironia bacifera	2.50
R Sph » <i>Chrysanthemum alpinum</i>	1.50
R » » arcticum.	1.50
R » » coronopifolium	1.50
V » » lacustre	0.75
V » » maximum	0.75
R » » niponicum.	1.50
V » » uliginosum.	0.75
R » » Zawadskyi.	1.50

En chrysanthèmes de Chine et du Japon, nous
possédons une collection des anciennes var. à fl.
petites, moyennes et pompons, les plus résistantes
et les plus florifères à 1 fr.

R Chrysogonum virginianum	2.50
R Chrysopsis foliosa	1.50
R » » villosa.	1.50
N H Chrysosplenium alternifolium, (<i>Dorine</i>).	1.—
N H » » oppositifolium	1.—
O Cimicifuga foetida, <i>Actaea foetida</i>	1.50
O » » racemosa, <i>Actaea racemosa</i>	1.50
R Cineraria aurantiaca	2.50
R » » campestris.	1.50
O Circæa alpina	0.50
O » » cordata	1.50
O » » Lutetiana	0.50
R G Cirsium acaule	1.—
R G » » <i>Eriophorum</i>	1.—
O » » Erisithales	1.—
H » » heterophyllum	1.—

		Fr. Cts
H	<i>Cirsium monspessulanus</i>	1.—
R	» <i>spinosissimum</i>	2.50
^	<i>Cistus albidus</i>	1.50
^	» <i>creticus</i>	1.50
R S	» <i>ladaniferus</i> (le plus beau)	2.50
R S	» <i>laurifolius</i>	2.50
^	» <i>monspessulanus</i>	1.50
^	» <i>populifolius</i>	2.50
R S	» <i>salviaefolius</i>	1.50

Ce sont les délicieuses Roses des rochers des régions méditerranéennes; petits arbustes aux fl. éphémères, mais des plus élégantes.

T	<i>Claytonia virginica</i>	2.50
---	--------------------------------------	------

CLÉMATITES HERBACÉES :

V R	<i>Clematis integrifolia</i>	1.—
V R	» <i>recta</i>	1.—
	» » <i>purpurescens</i>	2.50

CLÉMATITES GRIMPANTES

(Voir arbustes)

^	<i>Cneorum tricoccum</i>	2.50
R	<i>Codonopsis ovata</i> (<i>Glossocomia</i>)	1.50
R	» <i>lanceolata</i>	1.50
R	» <i>subsimplex</i>	1.50
R	<i>Colchicum alpinum</i>	1.—
Pr	» <i>autumnale</i> (<i>veilleuse</i>)	0.50
R	<i>Coluria potentilloides</i>	1.50
///	<i>Coluteocarpus reticulatus</i>	1.50
R	<i>Comarella multifoliata</i>	1.50
Pa	<i>Comarum palustre</i>	1.—
Pa	» <i>Semenowii</i>	1.—
R	<i>Convallaria majalis</i> , <i>Muguet</i>	0.50
	» » <i>var. major</i>	0.75
	» » <i>» rosea</i>	1.—
R ///	<i>Convolvulus althæoides</i>	2.50
R	» <i>cantabricus</i>	1.—
^ R	» <i>cneorum</i>	2.50
R	» <i>lineatus</i>	2.50
^ R	» <i>mauritanicus</i>	1.—
^ R	» <i>Soldanella</i>	2.50
/// R	<i>Corema alba</i>	2.50
V +	<i>Coreopsis grandiflora</i>	0.50
V +	» <i>lanceolata</i>	0.50
R	» <i>rosea</i>	1.50
V	» <i>tenuifolia</i>	1.—
V +	» <i>tripteris</i>	0.75

Plantes vivaces de grand effet et solides.

^ R	<i>Coris monspeliensis</i>	2.50
+ R	<i>Cornus canadensis</i>	2.50
R ±	<i>Coronilla cappadocica</i>	0.75
	» <i>glauca</i>	1.—
	» <i>junceae</i>	1.—
	» <i>lotoides</i>	2.50
R	» <i>montana</i>	0.75
R Pr	» <i>vaginalis</i>	0.75
^ Pr	» <i>varia</i>	0.75
R n	<i>Cortusa Matthioli</i>	1.—
R n	» <i>pubens</i>	1.50
O	<i>Corydalis australis</i> (<i>solida</i>)	1.—
O //	» <i>cava</i> (la douz. 2.—)	0.50
/// n	» <i>cheilanthifolia</i>	0.75

///	<i>Corydalis lutea</i>	0.50
// R	» <i>Halleri</i>	1.50
O	» <i>nobilis</i>	1.50
///	» <i>ochroleuca</i>	0.75
/// ^	» <i>thalictrifolia</i>	1.50
///	» <i>tomentella</i>	2.50
O //	» <i>tuberosa</i> (la douz. 2 fr.)	0.50
	» <i>Wilsoni</i>	2.50

Les Corydalis ou Fumetères vivaces, sont des pl. du premier printemps, tout au moins les espèces tubéreuses, qui recherchent l'ombre et les sous-bois. Le *C. lutea*, aux fl. d'un jaune brillant, fleurit d'avril en novembre. Planté dans un mur au soleil ou à l'ombre, il s'y propage rapidement. C'est l'une des plus gaies décorations qu'on puisse donner à une rocaille et à une muraille qu'on veut animer de fl. Il envahit rapidement.

Cotoneaster, voir arbustes.

+ R	<i>Cotula dioica</i>	0.75
+ R	» <i>potentilloides</i>	2.50
///	<i>Cotyledon chrysanthus</i>	1.—
^	» (<i>Echeveria</i>) <i>amena</i>	2.50
///	» (<i>Umbil.</i>) <i>ciliolata</i>	2.50
///	» » <i>erecta</i>	2.50
///	» » <i>globulariæfolia</i>	2.50
///	» » <i>Libanoticus</i>	2.50
R	» » <i>oppositifolia</i>	2.50
///	» » <i>platyphilla</i>	2.50
///	» » <i>Pestalozzæ</i>	2.50
///	» » <i>Sempervivum</i>	2.50
///	» » <i>simplicifolia</i>	2.50
///	» » <i>spinosa</i>	2.50
///	» » <i>umbilicus</i>	1.50

Pl. voisines des *Sempervivum*, à rosettes fermes et serrées, formant de gracieuses touffes qu'on place en plein soleil.

V R	<i>Crambe cordifolia</i>	2.50
^	<i>Crassula coccinea</i>	1.50
^	» <i>lycopodioides</i>	2.50
^	» <i>perfoliata</i>	2.50
^	» <i>sarcocaulis</i>	2.50
^	» <i>spatulata</i>	1.50
^	» <i>verticale</i>	2.50
Pr R	<i>Crepis aurea</i>	2.50
M	» <i>pygmæa</i>	2.50
V	<i>Crinum Powellii</i>	2.50
	» » <i>album</i>	2.50

Les rose très ornemental; culture facile; soleil et, si possible, un abri léger. Il est superbe à Floraire, au pied d'un mur en plein air.

R	<i>Crocus sativus</i>	0.50
Pr R	» <i>vernus</i>	0.50
Pr Bo	<i>Crucianella stylosa</i>	0.50
	» » <i>var. carmin</i>	0.50
R	<i>Crythmum maritimum</i>	2.50
+ R	<i>Cucurbita perennis</i> (<i>Courge viv.</i>)	5.—
/// M	<i>Cyananthus lobatus</i>	2.50

CYCLAMEN

I. A. FLORAISON PRINTANIÈRE :

R	<i>Cyclamen balearicum</i>	2.50
// R	» <i>Coum.</i>	1.50
	» » à fleurs blanches	1.50
R	» <i>ibericum</i>	1.50
// R ^	» <i>repandum</i> , <i>C. vernum</i>	1.—

II. A. FLORAISON AUTOMNALE

Fr. Cts

R ~	Cyclamen africanum	2.50
R	» europæum (la douz. 5 fr.)	0.50
	» hederæfolium, v. <i>neapolitan.</i>	1.50
R	» neapolitanum (la douz. 5 fr.)	0.50
	» » à fl. bl.	1.—

Les Cyclamens recherchent le mi-ombre et un sol bien drainé.

Cypripedium v. Orchidées

S R	Daphne alpina	2.50
O	» altaica	2.50
S R	» arbuscula	2.50
O R	» autumnale	2.50
R +	» Blagayana	2.50
S R	» buxifolia	5.—
O R	» caucasica (<i>salicifolia</i>)	2.50
R S Bo	» <i>cneorum</i>	1.50
	» » albiflorum, à fl. bl. pur.	5.—
	» » major	5.—
R ~	» collina (Fioniana ou Mazelli)	2.50
R ~	» Genkwa	5.—
O ~	» Gnidium	5.—
	» hybrida (Dauphini ou Delphini; v. Rot. Reg. pl. 1177)	2.50
O R	» Kamtschatica	5.—
O	» <i>Laureola</i>	2.50
O	» <i>Mezereum</i>	1.50
	» » album	2.50
	» » alpinum	2.50
R	» odora	5.—
S R	» oleoides	5.—
O	» Philippi	2.50
O	» Pontica	2.50
S ///	» rupestris (<i>petraea</i>)	2.50

Jolis pieds greffés ou élevés de boutures. Cette pl. superbe et si rare dans les jardins, se cultive dans les pentes des vieux murs ou des rochers, ou bien encore dans les plates-bandes au sec et au mi-soleil.

O R	Daphne Sophia	5.—
S R	» striata	2.50
O R	» Tangutica	5.—
S R	» Verloti	2.50
	Delphinium azureum	0.75
	» Belladonna	0.75
	» » grandiflora	1.—
	» » Stormonth	1.—
	» Bulleyanum	1.50
	» cachemirianum	1.50
	» Cœlesiris	1.50
	» elatum, <i>Pied d'alouette alpin</i>	1.—
	» Formosum	1.—
	» grandiflorum (le plus beau bleu imaginable — chienne) blanc	0.50
	» hybridum (collection de 40 d'entre les meil. var.) à	1.50

Ce sont de belles plantes vivaces propres à décorer les plates-bandes, le bord des massifs d'arbres, les grands rochers.

Fr. Cts

	Delphinium nudicaule	1.—
	» sulfureum (Zalil.)	2.50
	» superbissimum	1.—
	» Tatzuense	1.—
	» Tom Thumb (nain)	1.—
	Dentaria (<i>Cardamine</i>) bulbifera	0.50
	» digitata	0.50
	» enneaphyllos	1.—
	» laciniata	2.50
	» pinnata	0.50
	» polyphylla	1.—
	» Savinensis	2.50

Belles pl. aux grandes fl. lilas, blanches, roses ou jaunâtres, croiss. à l'ombre ou sous-bois.

DIANTHUS (Œillets)

ESPÈCES MONTAGNARDES OU ALPINES, NAINES ET CESPITEUSES :

R ///	Dianthus acaulis (<i>frigidus</i>)	1.50
R	» alpestris (très parfumé, rose clair)	1.—
	» alpinus (rose tr. vif)	1.50
///	» » albus	2.50
R	» alpino × barbatus	1.50
R	» arenarius	1.—
R ///	» arvernensis	1.—
R	» atrorubens	0.75
R	» brevicaulis	2.50
R ///	» cæsius	0.75
	» » major	1.—
R	» carinensis	1.50
R	» corsicus	1.—
R	» caucasicus	1.50
R V	Cyclope (belle forme hortico- le du Plumarius à très grandes fleurs)	1.—
R	» Cyri	1.50
R Bo ±	» deltoïdes (excellent pour ta- pissier rochers ou former bordures)	0.75
	» deltoïdes à fleurs blanches	0.75
	» » superbus	0.75
R	» fragrans (très parfumé)	0.75
///	» Freynii	2.50
///	» furcatus	1.—
/// R	» gallicus, très parfumé	1.—
R	» gelidus	2.50
R	» glacialis	1.50
R	» Gratianopolitanus	1.50
R ///	» graniticus	1.50
R ///	» Grisebachii	1.50
R	» integer	1.50
R	» Kamtschaticus	1.50
R	» Knappii (à fl. jaunes)	1.50
R	» Kitaibelii	1.50
///	» Lereschii	2.50
R	» liboschitzianus	1.50
///	» microlepis	2.50
R ///	» monspessulanus (fl. élégante lilas, parfum ; août-sept.)	0.75
R	» montanus	1.50
///	» Musalæ	2.50

	Fr. Cts
R /// <i>Dianthus neglectus</i> , <i>Oeillet bleu du Dauphiné</i>	1.50
R /// » <i>neglectus</i> , var. <i>grandiflorus</i>	2.50
R /// » » var. <i>nanus</i>	2.50
R » <i>nitidus</i>	2.50
R » <i>petræus</i>	1.—
R ± /// » <i>Plumarius</i> (très parfumé, florifère, envahissant rapidement, et propr. à garnir les talus arides, les lieux secs et au soleil ; mai-oct.)	0.50
» » <i>Plumarius</i> , variété <i>bicol.</i>	0.75
» » <i>candidus</i>	0.75
» » <i>flore pleno</i>	0.75
» » <i>floribundis</i>	0.75
» » <i>grandiflorus</i>	0.75
» » <i>hortensis</i>	0.75
» » <i>maximus</i>	0.75
» » <i>nanus</i>	0.75
» » <i>robustus</i>	0.75
» » <i>zonatus</i>	0.75
R » <i>pinifolius</i>	1.—
/// » <i>pyridicola</i> (de Grèce)	2.50
R » <i>rupicolus</i>	1.—
R » <i>speciosus</i> , voisin du <i>superbus</i>	0.50
/// » <i>spinosus</i>	2.50
/// » <i>subacaulis</i>	1.50
/// » » <i>pygmæus</i>	2.50
R » <i>Sundermanni</i>	2.50
R O // » <i>superbus</i> (élégant et parf.)	0.50
R /// » <i>sylvestris</i>	0.75
R » <i>virginæus</i> (<i>longicaulis</i>)	0.75
R » <i>Wimmeri</i> , voisin du <i>superbus</i>	1.—

Les espèces sans marque spéciale vont en pleine terre comme dans la roc., au soleil ou au demi-soleil. Tous fleurissent abondamment de mai-juin en automne.

	<i>Dianthus plus élevés</i>	1.—
R	<i>Dianthus arboreus</i>	2.50
O	» <i>Armeria</i> (peut croître sous bois)	0.50
R	» <i>Balbisi</i>	1.—
R	» <i>Bannaticus</i>	1.—
R V	» <i>barbatus</i> , <i>Oeillet des poètes</i>	0.50
R	» <i>capitatus</i>	0.75
R	» <i>carpathicus</i>	0.75
R Pr	» <i>Carthusianorum</i> , rose tr. vif	0.75
V	» <i>Cariophyllus</i> (<i>œillet des jardins</i>)	0.75
R	» <i>cruentus</i> , rouge vermillon ardent	0.75
R	» <i>giganteiformis</i>	1.—
R	» <i>giganteus</i>	1.—
R	» <i>liburnicus</i>	1.—
R	» <i>pinifolius</i>	0.50
R	» <i>pungens</i>	0.50
R O	» <i>Seguieri</i>	0.75
R	» <i>spiculifolius</i>	1.—
R	» <i>strictus</i>	1.—
R	» <i>tenuifolius</i>	0.75
R	» <i>versicolor</i>	0.75

Ces œillets sont tous très florifères et préfèrent le soleil à l'ombre, un sol plutôt léger ; juin-octobre. Roc. ou plate-bande.

	Fr. Cts
Bo V <i>Dianthus semperflorens</i> (<i>Œillet Flon</i>) à fl. carmin vif	1.—
» var. à fl. pleines, bigarrées de blanc et de carmin	1.50
R <i>Dicentra eximia</i>	1.—
Petit <i>Diclytra</i> à fl. carmin vif, très décoratives, gracieuses, qui fleurit abondamment d'avril à novembre à demi-ombre.	
H + <i>Dichondra repens</i>	1.50
V <i>Diclythra spectabilis</i>	1.—
V <i>Dictamnus albus</i> (<i>Fleur qui brûle</i>)	1.50
V » <i>Fraxinella</i> (<i>Burningbush</i>)	1.50
<i>Digitalis ambigua</i> , <i>D. grandiflora</i>	0.75
» <i>ferruginea</i>	0.75
» <i>lævigata</i>	0.75
» <i>lanata</i>	0.75
» <i>lutea</i>	0.50
» <i>parviflora</i>	0.50
» <i>purpurea</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50

Le *D. ambigua*, à grandes fl. jaune d'ocre, est précieux pour les rochers (demi-ombre) et la pl. terre ; le *lutea*, à petites fl. jaune paille très nombreuses, réussit n'importe où et fleurit tout l'été. Toutes les *Dig.* sont de culture très facile.

§ O <i>Dioscorea caucasica</i> (<i>Pl. grim-pante</i> aussi rare qu'élég.)	1.—
R O » <i>pyrenaica</i> (<i>pieds mâles et femelles</i>)	1.50
~ <i>Diotis candidissima</i>	1.50
~ <i>Diplacus</i> (<i>Mimulus</i>) <i>glutinosus</i>	2.50
/// <i>Diploxys repanda</i>	1.50
<i>Dodecatheon giganteum</i>	1.50
» <i>integrifolium</i>	0.75
» <i>Mædia</i>	0.75
» » <i>v. pauciflora</i>	1.—
» » <i>splendens</i>	1.—

Primulacées dont les fl. ressemblent à celles des *Cyclamens*, très élégantes, rose carmin ou clair, parfois blanc pur ; demi-ombre, sol profond et frais ; mai-juin.

<i>Doronicum austriacum</i>	1.—
» <i>caucasicum</i>	0.75
» <i>corsicum</i>	1.—
» <i>excelsum</i>	0.75
» <i>Pardalianches</i>	0.75

Soleils jaunes, apparaissant au printemps et très propres à garnir les lieux frais et demi-ombrés ; ce sont de belles marguerites or ou orange qui fleurissent avec abondance ; les *D. caucasica* en mars-avril. Pl. terre ou roco ; cult. facile.

R s <i>Dorycnium herbaceum</i>	1.—
R s ~ » <i>hirsutum</i>	1.50
R ± » <i>suffruticosum</i>	1.—

DRABA

I. ESPÈCES A FLEURS JAUNES :

/// <i>Draba affinis</i>	0.75
/// » <i>aizoides</i>	0.75
» » <i>grandiflora</i>	0.75
/// » <i>aizoon</i> (<i>lasiocarpa</i>)	0.75
/// » <i>armata</i>	1.—
/// » <i>athoa</i>	2.50
R » <i>aurea</i>	0.75

	Fr. Cts
/// Draba Bertoloni	1.—
/// » bruniaefolia	1.—
/// » cappadocica	2.50
/// » corsica	0.50
/// » dicranioides	1.50
/// » hispanica	1.—
/// » imbricata	2.50
R » olympica	1.—
/// » oxycarpa	2.50
± R » repens	1.50
/// » rigida	2.50
± R » scabra	2.50
R » tridentata	1.50

II. ESPÈCES A FLEURS BLANCHES :

/// Draba alpina	0.75
R » altaica	0.75
/// » androsacea	1.—
R » borealis	0.75
R » bronchialis	0.75
R » carinthiaca	0.75
R » chamæjasme	0.75
R » ciliata	0.75
R » contorta	0.75
R » Fladnizensis	0.75
/// » frigida	0.75
/// » glacialis	0.75
R » Gygas (Arabis carduchorum)	0.75
R » lactea	0.75
/// » nivalis	0.75
/// R » rupestris	0.75
R » stellata	0.75
R » Sundermanni	0.75
/// » tomentosa	2.50
/// R Drabapyrenaica (Petrocallis pyr.) à fl. rose tendre	2.50
R Dracocephalum austriacum	1.50
R » botryoides	1.50
R » Forresti	1.50
R » grandiflorum	2.50
R » nutans	0.50
R » Ruyschiana	0.50
R » speciosum	2.50
R » subsimplex	1.50

Labiées à fl. blanches ou blanches, basses, touffues,
fl. en mai-juillet-août.

± R /// Dryas Drummondii	1.—
/// R » integrifolia	2.50
± /// R » lanata, nivea, vestita	2.50
± /// R » octopetala, thé suisse	0.75
R » Sundermanni	2.50
T /// » tenella	2.50

Charmantes rosacées rampantes à beau feuillage
et à fl. d'églantines. Le D. octopetala est l'une des
meil. pl. de rocaïles ; elle tapisse les rocs ou le sol
et étale au soleil ses rameaux frais et gracieux et
sa belle églantine blanche au cœur d'or. Mai-juillet ;
refleurit souvent à l'automne.

± /// Drypis spinosa	1.50
/// » Echeveria alpina	2.50
/// R Echeveria amœna	1.—
» Imbricata	2.50
V Echinacea intermedia	1.50

	Fr. Cts
Echinacea purpurea	
» » splendida	1.50
Pl. vivaces à capitules rouge lie de vin, fleurissant tard et longtemps ; bons pour la fleur coupée.	
V Echinops Ritro	0.50
» » delphinensis	0.50
V » sphærocephalus	0.50
Hauts chardons aux fleurs bleues en boules sphé- riques.	
/// Echium petraeum (Moltkia)	1.50
R » rubrum	1.50
Edelweiss, v. Leontopodium alpinum	
Edrayanthus, v. Hedraeanthus	
R × Empetrum nigrum	1.50
R Endymion (Scilla) cedretorum	1.50
T Eomecon chionantha	2.50
/// » Ephedra altissima	2.50
/// R » distachya	2.50
+ /// » helvetica (les deux sexes)	1.50
R » procer	2.50
- /// » Sikkimensis	2.50
R n Epilodidum alpinum	0.75
» O » augustifolium (spicatum)	0.75
/// R « Dodonæi (Fleischeri)	0.75
± O » glabellum	0.50
Pa » hirsutum	0.50
+ R » linnæoides	0.75
R n » luteum, à fl. jaune clair	2.50
/// R » rosmarinifolium	0.75

Toutes, sauf Dodonæi et rosmarinifolium, demandent
la fraîcheur et le mi-ombre. Mai-octobre.

Epimedium alpinum	0.50
» colchicum, v. pinnatum	
» diphyllum	1.50
» hexandrum, v. Vancouveria	
» lilacinum	1.50
» macranthum	1.—
» Musschianum	1.50
» ochroleucum	1.—
» pinnatum	1.—
» rubrum	1.—
» versicolor	1.50
» violaceum	2.50

Les Epimèdes sont d'entre les meilleures plantes
d'ombre ; ils font admirablement sous bois fleu-
rissent en avril-mai et offrent une verdure mer-
veilleuse toute l'année durant.

R Pr Eranthis cilicica	1.—
R Pr » hyemalis	0.50
R Pr » sibirica	1.—
R Pr » Tubergeni	1.50

Petites Hellébore jaunes, fleurissant sous bois ou
dans l'herbe, à l'ombre ou au soleil, de fin janvier
à mars.

V Eremostachys laciniata	2.50
Eremurus altaicus	2.50
» Bungei	5.—
» Elwesianus	6.—
» himalaicus	5.—
» robustus	5.—
» Olgæ	8.—
» spectabilis	2.50

	Fr. Cts
Eremurus Tubergeni	8.—
Bonne terre, plein soleil, terrain drainé.	
~ Erica arborea	2.50
R S » » alpina	2.50
± R S Bo Erica carnea, Bruyère rose des Alpes	1.—
Erica carnea à fl. blanc pur	1.50
× Erica ciliaris	2.50
× » cinerea	2.50
R » mediterranea	2.50
× » multiflora	1.50
R S » stricta (E. corsica) fl. rose vif, nombr; été et aut.	1.50
× » tetralix	2.50
R × » vulgaris	2.50
R × » Wilsoni	5.—
× » vagans	2.50

L'E. carnea, la plus rustique de toutes, donne de janvier à mars-avril, une abondance de fl. rose carmin; soleil ou mi-ombre; c'est la seule esp. avec stricta (qui forme de beaux buissons, fleurissant tout l'été), qui supporte bien le calcaire; les autres exigent une terre siliciense (terreau de feuilles ou terre dite de Bruyère), elles vont bien dans le sphagnum.

R Erigeron alpinus, Vergerette des Alpes	1.—
R » aurantiacus	0.75
R » compositus	0.50
V + » flagellaris	0.50
R Bo » glabellus	0.50
R » glaucus	0.50
V » hybridus roseus	1.50
R /// » leiomerus	1.50
R » macranthus	0.75
R » Mairei	1.—
R /// » mucronatus (Vittadenia triloba)	0.50
V Pa » Philadelphicus	0.75
R » pulchellus (caucasicus)	0.75
V » speciosus	0.75
/// » trifidus	1.—
/// » uniflorus	1.—
R » Villarsii	1.—
R S Erinacea pungens, genêt pourpre	2.50
/// Erinus alpinus	0.50
/// » » à fl. blanches	0.50
/// » carneus (nouveau)	1.50
/// » hirsutus	0.50
/// » » à fl. blanches	0.50
/// » hirsutissimus	2.50
/// Erinus hispanicus	1.50

Excellentes pl. murales et saxatiles à fl. roses, violettes ou blanches; mai-juin.

R Eriogonum arborescens	2.50
R » flavum	2.50
R » Jamesi	2.50
R » racemosum	2.50
± R » umbellatum	1.50
R Eriogynia (Spiraea) pectinata	2.50
Pa Eriophorum angustifolium	1.—
» latifolium	1.—

± R Eriophyllum caespitosum fl. jaune orangé; feuilles tomenteuses; pl. de gd effet, excel. pour les lieux ensoleillés	0.75
M /// T Eritrichium nanum, Roi des Alpes	2.50

Le Roi des Alpes est de culture plutôt difficile. Il lui faut la position horizontale, c'est-à-dire une fente de rocher ou de muraille, le levant ou le couchant et un sol très maigre. Pour la cult. en pots il faut tenir très sec, l'air restant humide. Nous le cultivons pour la vente dans le sable granitique et le tenons sec l'hiver.

R /// Erodium absinthoides, Sibthor- pianum	1.50
/// » amatum	1.50
R /// » carvifolium (daucoides)	1.—
R » chamædryoides (Reichardii)	1.50
» cheilantifolium, v. trichoma- næfolium	
R /// » chysanthum	2.50
R » corsicum	2.50
/// » Crispii	5.—
R /// » glandulosum, v. macradenum	2.50
R /// » Guiccardi	2.50
/// » guttatum	2.50
R /// » hymenodes	0.75
R /// » macradenum	1.—
R » Manescavi	1.—
/// » petræum	1.50
R » Reichardii, (chamædryoides)	1.50
R » Romanum	1.50
R /// » supracanum	2.50
~ T Erpetion reniforme	1.50
V Eryngium agavæfolium	1.—
R V » alpinum, chardon bleu. Pani- caul des Alpes, Reine de l'Alpe	1.—
» » grandi florum	1.50
R V » amethystinum	1.—
R V » Bourgati, Chardon bleu des Pyrénées	1.50
R V » cœruleum (creticum)	1.—
R V » Florariensis	2.50
R V » giganteum	1.—
R V » maritimum	2.50
R V » oliverianum	1.—
R V » planum	0.75
R » serbicum	2.50
R » spino-alba (vrai)	2.50
R » Violacea	2.50

Les Panicaux sont d'entre les plus ornementales des pl. alpines. Le Panicaux des Alpes (*Blue thistle* des Anglais) est une merveille végétale; la collerette admirablement ouvragée, en filigrane et de teinte bleu-violet, qui porte le chaton de fleurs, est puissamment artistique. Toute la partie supérieure de la plante (haute de près d'un mètre), se teinte en bleu-violet et conserve cette couleur pendant près de six semaines (juin-juillet). La multiplication de cette plante est lente et difficile, car les graines germent capricieusement; mi-soleil; sol profond, ni trop lourd ni trop léger; fait bien dans les gazons. Les E. amethystinum, des Alpes orientales, et Bourgati, des Pyrénées, sont également jolis. Tous bleuissent leurs feuillages au moment de l'anthèse.

			Fr. Cts
V R	<i>Erysimum Allionii</i> (la douz. 2 fr.)	0.50	
Très belle giroflée orange vif, à floraison abondante.			
///	» <i>Kotschyannum</i>	1.50	
R	» <i>leptophyllum</i>	1.50	
R	» <i>linifolium</i> (violet).	1.50	
R	» <i>nanum</i>	0.50	
± R ///	» <i>ochroleucum</i>	1.—	
R ± ///	» <i>pulchellum</i>	1.—	
R	» <i>pumilum</i>	1.—	
R ///	» <i>purpureum</i>	1.50	
± Pa ×	<i>Erythræa diffusa</i> (Massoni).	2.50	
T R	» <i>linarifolia</i>	1.50	
T R	» <i>ramosissima</i>	1.50	
Pr O	<i>Erythronium dens canis</i> (Dent de chien). La douz. 4 fr.	0.50	
	» <i>dens canis album</i>	0.75	
///	<i>Eunomia cordata</i>	1.50	
///	» <i>rotundifolia</i>	2.50	
V	<i>Eulalia japonica</i> Zebrina.	1.—	
V	<i>Eupatorium ageratoides</i>	1.—	
V	» <i>verticillatum</i>	1.—	
R ///	<i>Euphorbia capitulata</i>	1.50	
R	» <i>Characias</i>	1.50	
R	» <i>Dendroides</i>	1.50	
R	» <i>Gerardiana</i>	1.50	
R	» <i>Gregersenii</i>	1.—	
R /// ±	» <i>herniariæfolia</i>	1.50	
R	» <i>Kotschyana</i>	1.50	
R	» <i>montenegrina</i>	1.—	
/// R	» <i>myrsinites</i>	0.50	
Pl. à longs rameaux trainants, garnis de fl. serrées et bleuâtres, disposées en spirales; pl. méditerranéenne très ornementale, précieuse pour la décoration des rochers ensoleillés, des pentes arides et des moraines stériles.			
R	<i>Euphorbia pilosa</i> (polychroma).	1.50	
R	» <i>rigida</i> (biglandulosa)	2.50	
///	» <i>spinosa</i>	2.50	
R	» <i>Wulfeni</i>	1.50	
R ///	<i>Evonymus pygmæa</i>	1.50	
± ~	<i>Falkia repens</i>	2.50	
R	<i>Farsetia clypeata</i>	0.50	
///	» <i>triquetra</i>	2.50	
R	<i>Farfugium grande</i>	2.50	
R	<i>Felicia</i> (Agathea) <i>petiolata</i>	1.—	
R	<i>Ferula communis</i> (très beau feuillage divisé)	1.50	
R	» <i>glauca</i>	1.50	
Pl. remarquables par la majesté de leur port, leurs amples proportions et par la beauté du feuillage; sol profond, exposition abritée.			
R	<i>Festuca crinum ursi</i> (la douz. 2 f.)	0.50	
R	» <i>glauca</i> (herbe bleuâtre)	0.50	
R	» <i>punctoria</i>	0.50	
R	<i>Ficaria grandiflora</i>	0.50	
R	» <i>ranunculoides</i> fl. plena	2.50	
R	» » fl. alba	2.50	
±	<i>Fragaria californica</i>	0.50	
±	» <i>indica</i> (à fl. jaunes)	0.50	
±	» <i>monophylla</i>	0.50	
±	» <i>roseiflora</i> (à fl. roses).	0.50	
±	» <i>Fraise des bois</i>	0.50	
~ R	<i>Francoa appendiculata</i>	1.—	
~ R	» <i>rupestris</i>	1.—	
T R	<i>Frankenia hirsuta</i>	1.50	
± ~	» <i>lævis</i>	1.50	
R P	<i>Fritillaria Burnati</i>	1.50	
R P	» <i>delphinensis</i>	1.50	
V	» <i>imperialis</i>	1.50	
R	» <i>involucrata</i>	1.50	
R Pr	» <i>Meleagris</i>	0.50	
	» » <i>alba</i>	0.50	
R	» <i>Moggridgei</i>	2.50	
R	» <i>oranensis</i>	2.50	
R Pr	» <i>pyrenaica</i>	1.50	
R	» <i>tenella</i>	1.—	
	<i>Fuchsia pumila</i>	1.50	
	» <i>gracilis</i>	1.50	
~	<i>Fumana procumbens</i>	1.50	
~	» <i>lævipes</i>	1.50	
	<i>Funkia (Hemerocallis) Fortunei</i>	1.—	
	» <i>glauca cordata</i>	1.—	
	» <i>grandiflora</i>	1.—	
	» <i>lanceifolia</i>	1.—	
	» <i>ovata (cærulea)</i>	1.—	
	» » <i>var. marginata</i>	1.—	
	» <i>Sieboldiana (cucullata)</i>	1.—	
	» » <i>variagata</i>	1.—	
	» <i>subcordata (alba)</i>	1.—	
Excellentes pl. d'ombre, à grand et beau feuillage, aux fl. très parfumées chez plusieurs; bonnes pour les situations au nord.			
V +	<i>Gaillardia grandiflora</i>	0.50	
L'une des meilleures pl. vivaces; gros capitules jaune et rouge, de juin-octobre.			
Pr R	<i>Galanthus nivalis</i> , perce-neige (la douz. 2 fr.)	0.50	
V +	<i>Galatella canescens</i> , pl. excellente à longue floraison autom.	0.75	
	<i>Galega officinalis</i>	0.50	
O	<i>Galeobdolon luteum</i> (ortie jaune)	0.50	
±	<i>Galium Baldense</i>	0.75	
±	» <i>incanum</i>	1.—	
G ±	» <i>purpureum</i>	0.50	
±	» <i>rubrum</i>	0.50	
±	<i>Gaura coccinea</i>	1.—	
V +	» <i>Lindheimeri</i>	0.75	
L'une des plus gracieuses d'entre les plantes vivaces et des plus florifères.			
± R	<i>Genista sagittalis</i>	1.50	
± /// R	» <i>Villarsii</i> (pl. minuscule)	2.50	
Voir en outre aux arbustes.			
I. GENTIANES			
Bo R	<i>Gentiana acaulis</i>	0.75	
	» » <i>alba</i>	2.50	
Ce type renferme cinq espèces parfaitement distinctes, qui sont:			
R	<i>Gentiana alpina</i>	2.50	
R	» <i>angustifolia</i> la meilleure pour jardin	0.75	
R	» <i>Chusii</i>	1.50	
R	» <i>dinarica</i>	2.50	
R ×	» <i>Kochiana</i>	0.75	

II. GROUPE DES ESPÈCES ÉLEVÉES, A GROSSES RACINES CHARNUES :

	Fr. Cts
R G <i>Gentiana lutea</i> , Grande gent. jaune	1.50
R » <i>pannonica</i>	2.50
R » <i>punctata</i>	2.50
R + » <i>purpurea</i>	2.50

Il faut à ce groupe un sol profond et pierreux (calcaire pour lutea), une exposition au mi-soleil; ne jamais entamer ni couper de racines lors du repiquage ou de la transplantation.

III. ESPÈCES BASSES ET CESPITEUSES :

M R <i>Gentiana angulosa</i>	2.50
T Sp » <i>bavarica</i>	2.50
R M » <i>Farreri</i>	2.50
M R » <i>brachyphylla</i>	2.50
R /// » <i>Favrati</i>	2.50
T M Sp » <i>imbricata</i>	2.50
R M » <i>Purdoni</i>	2.50
R H » <i>lagodechiana</i>	1.50
T M Sp » <i>pyrenaica</i>	2.50
T M Sp » <i>Rostani</i>	2.50
R T » <i>septemfida</i>	1.50
» » <i>latifolia</i>	2.50
R » <i>sino-ornata</i>	2.50
T R » <i>verna</i>	1.—
» » <i>chionodoxa</i> , fl. blanc	
» » pur	2.50
» » <i>atrocœrulea</i> (bl. fon.)	2.50
» » <i>azurea</i> (bleu clair)	2.50
» » <i>grandiflora</i>	2.50
» » <i>violacea</i>	2.50

IV. ESPÈCES DES LIEUX HUMIDES ET PALUDÉENS :

H Pa O <i>Gentiana asclepiadæa</i>	1.50
» » <i>alba</i>	2.50
H Pa T » <i>pneumonanthe</i>	1.50

V. ESPÈCES DE CULTURE SPÉCIALE :

<i>Gentiana ciliata</i>	2.50
» <i>detonsa</i>	2.50
» <i>Freyniana</i>	2.50
» <i>frigida</i>	2.50
» <i>Froelichii</i>	2.50
» <i>Parryi</i>	2.50
» <i>pumila</i>	2.50
» <i>Purdomi</i>	1.50
» <i>Watsoni</i>	2.50

Il leur faut un sol composé de terreau de feuilles, de sable et de tourbe, le tout additionné de cailloux concassés; mi-soleil.

VI. ESPÈCES DE CULTURE FACILE :

<i>Gentiana crassicaulis</i>	1.50
» <i>cruciata</i>	1.50
» <i>dahurica</i>	1.50
» <i>Fetisowi</i>	1.50
» <i>Kesselringii</i>	1.50
» <i>macrophylla</i>	1.50
» <i>Olivieri</i>	1.50
» <i>phlogifolia</i>	1.50
» <i>straminea</i>	1.50

<i>Gentiana tibetica</i>	1.50
» <i>tubulosa</i>	2.50
» <i>Walujewi</i>	1.50

Un bon sol profond dans une niche de rocaillies ou dans une plate-bande leur suffit.

R <i>Geranium aconitifolium</i> (<i>G. rivulare</i>)	1.—
R » <i>albanum</i>	0.75
V » <i>albiflorum</i>	0.75
R /// » <i>argenteum</i> (l'un des plus beaux)	1.50
V » <i>armenum</i>	1.50
R + » <i>atlanticum</i>	1.—
R /// » <i>cinereum</i> , des Pyrénées	1.—
V » <i>Endressi</i>	0.50
R » <i>Fremonti</i>	1.—
+ R » <i>grandiflorum</i>	1.—
V » <i>gymnocaulon</i>	1.—
V » <i>ibericum</i>	1.—
G R » <i>lividum</i>	1.—
R » <i>maculatum</i>	1.50
R » <i>macrorhizum</i>	0.75
R » <i>nepalensis</i>	0.75
Pa R » <i>nodosum</i>	0.75
H » <i>palustre</i>	0.75
Pr V // » <i>phæum</i>	0.75
R » <i>platyanthum</i>	1.—
R » <i>platypetalum</i>	1.—
+ G » <i>pratense</i>	0.50
» » fl. pl.	1.50
+ R » <i>sanguineum</i> (pl. basse et étalée, à très nombr. gr. fl. rose vif; très facile; soleil ou mi-ombre; mai-sept.)	0.75
» » <i>sanguineum</i> à fl. blanche	0.75
» » v. <i>prostratum</i>	1.50
R » <i>sessiliflorum</i>	2.50
R » <i>subcaulescens</i>	2.50
O R » <i>sylvaticum</i>	0.75
R » <i>Traversi</i>	2.50
R + » <i>tuberosum</i>	1.—
R » <i>Yunnanense</i>	2.50

Tous ces Ger. sont très solides et florifères.

R + <i>Gerbera Jamesoni</i>	2.50
R <i>Geum Borissii</i>	2.50
R » <i>bulgaricum</i>	2.50
V R » <i>chiloense</i>	0.75
» » var. <i>astrosanguineum</i>	0.75
+ V R » <i>coccineum</i>	0.75
V R » <i>coccineum</i> , var. <i>grandiflorum</i>	1.—
» » var. fl. pleno	1.50
R » <i>Florariense</i> (jaune et brun.)	1.—
R » <i>Heldreichii</i>	1.—
R » » <i>magnificum</i>	1.50
R » <i>Lady Stratheden</i>	1.50
R » <i>miniatum</i>	1.50
R » <i>montanum</i>	1.—
» » var. <i>aurantiacum</i>	2.50
» » <i>maximum</i>	2.50

	Fr. Cts
R Geum Mrs Bradshaw	1.—
R » pyrenaicum	1.—
/// » reptans.	1.50
Pa » rivale	0.75
» » var. superbum	1.50
R » Rossii	1.50
R Pa » speciosum	5.—
Pa » triflorum	1.—
R Gilia coronopifolia	1.—
V R Gillenia trifoliata	1.50
Gracieuses Spirées à fl. blanches, à grands pétales, très rustique; mi-août; mi-soleil.	
R Gladiolus communis	0.50
R » Illyricus	0.50
R » imbricatus	0.50
Pa » palustris	0.50
R » segetum	0.50
Charm. gleyeuls miniature d'un carmin très vif.	
+ R Glaucium flavum, Pavot marin	0.50
+ R » rubrum, à fl. rouge-brique	0.50
+ R » tricolor	1.—
Curieuses papavéracées à feuillage glauque, élégamment découpé, persistant l'hiver et constituant une belle décoration, même pour la fl. coupée et la décoration de tables et de salons; fl. jaunes ou rouges, très solides partout, mais préfère un sol léger et sablonneux et le soleil.	
+ Pa Glaux maritima	1.—
R+R Glechoma hederacea fol. var.	0.75
+ Globularia alypum	2.50
R /// » bellidifolia	1.50
» » minor	1.50
+ R /// » cordifolia	0.50
» » à fl. blanches	1.50
/// » incanescens	2.50
R /// » nana	1.50
G R » nudicaulis	0.50
+ R /// » trychosantha	1.—
R /// » vulgaris	0.50
» » à fl. blanches	1.—
Pl. de soleil et de rochers; plusieurs sont rampantes et cespitueuses et la prem. est l'une des meill. pl. de roc, pour le soleil; fl. lilas, en capitules serrés, en boules sphériques chez les trois dernières, aplaties chez les trois premières. Mai-juin.	
Gnaphalium Leontopodium, v. Leontopodium alpinum.	
+ T Goodenia repens	1.—
V Grindelia robusta	0.50
/// R Gutierrezia Euthamiae	1.50
R V Gynerium argenteum (Herbe des pampas).	2.50
R Gymnolomia multiflora	1.—
R /// Gypsophila alpigena	1.—
/// » aretioides	1.—
R /// » cerastioides	1.50
R /// » Libanotica	1.—
+ V » paniculata	1.—
» » fl. pl.	2.50
+ R » repens	0.75
» » var. monstrosa; plus gr. dans toutes ses formes	1.50
V » scorzoneraefolia	0.50

	Fr. Cts
R Gypsophila Sundermanni	1.50
S /// » transylvanica	1.50
Ce sont des cariophyllées aux très nombreuses fl. blanches ou roses, aimant le soleil et préférant le calcaire à la silice. Le G. repens est l'une des meill. et des plus florifères d'entre les pl. de rocailles; pl. très retombante, se couvrant tout l'été de fl. rose clair; feuillage glauque.	
/// n Haberlea Rhodopensis	1.50
/// n » Ferdinand-Coburgi	2.50
O Hacquetia Epipactis	0.50
+ RS Hedreanthus (Edrayanth.)	1.50
/// » Bosniacus	2.50
» » caricinus	2.50
/// » croaticus	1.50
/// » dalmaticus (caudatus).	1.—
/// » dinaricus	2.50
/// » graminifolius	1.—
/// » Kitaibelii	1.50
/// » pumilio	2.50
/// » serpyllifolius	2.50
/// » » var. major	2.50
/// » tenuifolius	1.—
Ce sont de gracieuses Campanules des rochers, qui fleurissent abondamment de mai en juillet et aiment les fentes des murs et des rocailles en pl. soleil; fl. lilas ou violet plus ou moins foncé, disposées en capitules.	
R n Hedysarum obscurum	1.—
R ^ Heeria elegans	2.50
V Helenium autumnale	0.75
V » Bigelowi	1.50
V » cupreum (rouge cuivre)	1.—
V » Hoopesi	1.50
V » pumilum magnificum	1.50
V Helianthella quinquenervis	1.50
V » uniflora	1.50
Helianthemum alpestre jaune cl.	0.75
» amabile, rose	0.50
» apenninum, blanc pur	0.50
» » à fl. pleines	1.—
» atrosanguineum, carmin vif	1.—
» Aurora, rose saumon	1.—
» bicolor, jaune rouge	1.—
» canum, jaune clair	1.—
» coccineum, rouge très vif	0.50
» » à fl. doubles, rouges, juin-oct.	1.—
» cruentum, rouge sombre	1.—
» cupreum, rouge cuivre	1.—
» Fumana, jaune clair	1.50
» grandiflorum, jaune vif	0.50
» grandiflorum, fl. pl. à fl. très doubles; mai-août	1.—
» lavandulaefolium, jaune	1.—
» lunulatum, jaune ponctué	1.—
» mutabile	0.50
» celandicum, jaune	1.—
» polifolium, blanc	1.—
» » à fl. roses	0.50
» procumbens, jaune	1.50
» roseum, beau rose	0.50
» rubrum, rouge vif	0.50
» sanguineum, carmin vif	0.50

	<i>Helianthemum tomentosum</i> , jaune	Fr. Cts
Pr.	» <i>vulgare</i> , jaune	0.50
	» » fol. var.	0.50

Les Hélianthes (Rockroses des Anglais) sont de petits arbustes couchés, les meilleurs pour garnir les rochers ensoleillés, les pentes arides et sèches, les sols exposés au soleil ; on en fait des bordures et des corbeilles. Leurs fleurs ont l'aspect de petites Eglantines et offrent toutes les teintes en dehors de la couleur bleue ; on en a même à fl. doubles. Ils ne s'élèvent pas au-dessus de 20 à 25 cm. et se couvrent littéralement de fl. de mai en juillet ; puis, si l'on a soin de couper immédiatement les tiges qui ont fleuri et d'empêcher la graine de mûrir, on a une nouvelle floraison en septembre-octobre et jusqu'en hiver. Leur feuillage est à lui seul un ornement de valeur ; mais ce qui les rend précieux, c'est leur solidité à toute épreuve et leur constitution, qui résiste aux plus fortes sécheresses.

V	<i>Helianthus</i> (Soleils) <i>californicus</i> .	0.75
	» <i>ciliaris</i>	1.50
	» <i>doronicoïdes</i>	0.50
	» <i>grosse-serratus</i>	0.50
	» <i>Maximiliani</i>	0.50
	» <i>multiflorus</i>	0.50
	» » fl. duplex	0.75
	» » fl. pl.	0.75
	» <i>Orgyalis</i>	0.50
	» <i>rigidus</i> (<i>Harpalium</i>)	0.50
R	<i>Helichrysum bellidioides</i>	2.50
R S	» <i>lanatum</i>	1.—
+ R S	» <i>odoratissimum</i>	1.—
R S	» <i>Stœkas</i>	1.50
R S	» <i>Tschianticum</i>	2.50
V	<i>Heliopsis lævis</i>	1.—
	» <i>scabra</i>	1.—
	» » <i>grandiflora</i>	1.50
	» » <i>semi plenum</i>	1.50
	<i>Helleborus Abschasicus</i>	1.50
	» <i>atrorubens</i>	1.50
	» <i>colchicus</i>	1.50
	» <i>corsicus</i>	2.50
	» <i>foetidus</i>	0.50
	» <i>guttatus</i>	1.50
	» <i>hybridus</i>	1.—
	» <i>niger</i>	1.—
	» » var. <i>altifolius</i>	2.50
	» <i>occidentalis</i>	1.50
	» <i>orientalis</i>	1.—
	» <i>purpurascens</i>	1.—
	» <i>viridis</i> (fl. vertes)	1.—

Les Hellebores recherchent un sol riche en humus et un peu pierreux, une exposition un peu fraîche et mi-ombragée. Il faut éviter de les transplanter souvent.

±	<i>Helxine Soleirolii</i>	1.—
V	<i>Hemerocalis flava</i>	1.—
V	» <i>fulva</i>	1.—
V	» <i>fulva</i> , fl. pleno	2.50
V	» <i>graminea</i>	1.—
V	» <i>Middendorffiana</i>	1.—

Hepatica, v. *Anemone hepatica*.

Mél.	<i>Heracleum Mantegazzianum</i>	1.—
------	---	-----

Plante gigantesque que nous avons introduite du Caucase ; propre à décorer les grands rochers ou à être isolée dans les parcs et jardins ; mellifère et très recherchée des abeilles. Pl. des plus

ornementales ; sol frais, gras et profond. Le botaniste Levier, qui nous a rapporté les graines du Caucase et qui l'a décrite d'après les échant. que nous en avons obtenus, affirme que l'ombelle que nous lui en avons adressée portait 10,000 fl.

± S	<i>Herniaria glabra</i> (la douz. 2 fr.)	0.50
Plante tapissante, dont on forme des gazons, fonds de parterre, et qui résiste à la sécheresse et à la pluie, ne craint pas le grand soleil et est d'une culture très facile.		
± S	<i>Herniaria incana</i>	0.50
± S	» <i>pyrenaica</i>	0.50
V	<i>Hesperis Dinarica</i>	0.50
	» <i>matronalis</i> (<i>Girarde</i>)	0.50
	» » <i>candidissima</i>	0.50
	» » à fl. pleines	1.50
	» » à fl. bl. pl.	1.50
R O	<i>Heuchera brizoides</i>	1.—
R O	» <i>purpurescens</i>	1.—
R O	» <i>rubescens</i>	1.—
R O	» <i>rosea</i>	1.—
V + R	» <i>sanguinea</i>	0.75

Fl. rouge corail très vif, en grappes dressées à grand effet, excellente pour bouquets ; mai-septembre ; très solide ; pl. précieuse et recommandable.

	<i>Heuchera sanguinea alba</i>	1.—
	» <i>sanguinea grandiflora</i>	1.50
	» » <i>splendens</i>	1.50
V	<i>Hibiscus militaris</i>	2.50
V	» <i>palustris</i>	2.50
V	» <i>roseus</i>	2.50
	» <i>albus</i>	2.50

Pl. vivaces de très grande valeur ornementale ; très grandes fl. de mauves d'un rose plus ou moins ardent (juillet-septembre), sol profond, frais et léger.

R	<i>Hieracium albidum</i> (<i>H. intyba-ceum</i>)	1.50
Pr V	» <i>aurantiacum</i>	0.50
///	» <i>lanatum</i> . <i>Andryala lanata</i>	0.50
±	» <i>pilosella</i>	0.50
R	» <i>rubrum</i>	1.—
Pr R	» <i>stoloniflorum</i>	0.50
///	» <i>villosum</i>	0.50
R	<i>Hippocrepis comosa</i>	1.—
Aq	<i>Hippuris vulgaris</i>	0.50
R O	<i>Homogyne alpina</i>	0.75
	» <i>discolor</i>	1.50
R	<i>Horminum pyrenaicum</i>	0.50
V R H	<i>Hoteya japonica</i>	1.—
Aq	<i>Hottonia palustris</i>	2.50
T	» <i>Houstonia cœrulea</i>	2.50
Pa	<i>Houttuynia cordata</i>	1.50
O R	<i>Hugueninia tanacetifolia</i>	2.50
/// n	<i>Hutschinsia</i> (<i>Lepidium</i>) <i>alpina</i>	2.50
/// n	» <i>Auerswaldii</i>	1.—
///	» <i>brevicaulis</i>	1.—
R	<i>Hydrophyllum occidentale</i>	1.—
R O	<i>Hylomecon</i> (<i>Stylophorum</i>) <i>vernalis</i>	2.50
R	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	0.50
	» <i>candicans</i>	1.—
× O	<i>Hydrastis canadensis</i>	2.50

	Fr. Cts
V R <i>Hypericum Androsæmum</i>	0.50
R » <i>ægyptiacum</i>	2.50
R + » <i>Aureum</i>	1.—
~ » <i>balearicum</i>	2.50
± » <i>calycinum</i> . La douz. 4 fr.	0.50
L'une des meilleures pl. tapissantes pour sous-bois, lieux arides, à l'ombre ou au plein soleil; envahissante et très solide; beau feuillage et très grandes fl. jaune brillant.	
/// <i>Hypericum Coris</i>	1.—
R » <i>densiflorum</i>	1.—
R » <i>empetrifolium</i>	1.50
R » <i>elongatum</i>	1.50
/// » <i>fragile</i>	2.50
R » <i>galioides</i>	1.50
R » <i>Henryi</i>	1.50
R » <i>hircinum</i>	0.75
R » <i>Hookerianum</i>	1.50
R » <i>hyssopifolium</i>	1.50
R » <i>Kalmianum</i>	1.50
/// » <i>Kotschyannum</i>	1.50
R » <i>Lysimachioides</i>	2.50
R » <i>montanum</i>	1.50
R » <i>moserianum</i>	1.—
± /// » <i>nummularium</i>	1.50
± » <i>olympicum</i>	1.—
~ » <i>orientale</i>	1.50
/// » <i>organifolium</i>	1.—
+ R » <i>patulum</i> , Rose de Saron	1.50
Pr. » <i>perforatum</i> , <i>Millepertuis</i>	0.50
R » <i>polyphyllum</i>	1.50
B O ± » <i>repens</i> (brillante espèce naine à floraison prolongée).	0.75
R » <i>Rhodopæum</i>	1.—
R » <i>Richeri</i>	1.50
R » <i>tomentosum</i>	1.50

Les *Hypericum* ont tous des fl. jaunes, brillantes et le plus souvent très ornementales; ils recherchent en général les lieux ensoleillés; mai-juillet.

<i>Hyssopus officinalis</i>	1.—
» <i>officinalis</i> à fl. blanches.	1.—
» » à fl. rouges.	1.—

L'*Hyssopus* est d'entre les pl. aromatiques les plus appréciées; croît dans les lieux les plus arides et stériles, au grand soleil, et ses fl. bleu foncé (blanches ou rouges chez les var. sont un bel ornement; juillet-octobre.

/// <i>Iberis Garrethiana</i>	1.—
R /// » <i>Gibraltarica</i>	0.50
/// » <i>Jordani</i>	1.—
R /// » <i>jucunda</i> (<i>æthionema coridif.</i>)	2.50
/// S » <i>saxatilis</i> (<i>semperflorissant</i>).	1.—
R » <i>semperflorens</i>	1.—
± R » <i>sempervirens</i>	0.50
» » var. fl. pl.	0.75
» » var. <i>nana</i>	0.75
/// » <i>stylosa</i>	1.—
R. O <i>Imperatoria Ostruthium</i>	1.—
V <i>Incarvillea Delavayi</i>	1.50
V » <i>grandiflora</i>	2.50
» » <i>brevipes</i>	2.50
V » <i>Olgæ</i>	1.—

Très belles Bignoniacées de pl. terre, rustiques florifères et des plus recommandables; fl. roses.

	Fr. Cts
R <i>Inula acaulis</i>	1.50
R Bo » <i>ensifolia</i> (excellente pl. basse)	0.50
+ R » <i>glandulosa</i>	1.—
» » var. <i>grandiflora</i>	1.50
V » <i>Helenium. Aulnée</i> (meilleur remède contre paresse. d'estomac).	1.—
R » <i>hirta</i>	0.75
R S » <i>limonifolia</i>	1.50
V » <i>macrocephala</i>	1.—
R » <i>montana</i>	0.75
V » <i>Royleana</i>	1.—
V » <i>salicina</i>	0.75

Les *Aulnées* sont de bonnes pl. de pleine terre, grandes Marguerites jaunes fleurissant l'été; mi-soleil.

<i>Ipomœa Pandurata</i>	2.50
-----------------------------------	------

Volubilis vivace d'une grande vigueur et de haute valeur décorative; fleurs blanches à gorge pourpre. Soleil, sol profond.

H <i>Iris acoroides</i> ¹	1.—
R » <i>alata</i>	1.50
R » <i>aphylla</i>	1.—
R » <i>arenaria</i>	1.50
R » <i>asiatica</i>	1.—
R » <i>Askabadensis</i>	1.50
R » <i>Balkana</i>	1.—
R » <i>benacensis</i>	1.50
R » <i>biflora</i>	1.—
R » <i>Biliotti</i>	1.—
R » <i>bosniaca</i>	1.50
R » <i>Bulleyana</i>	1.50
R » <i>cæspitosa</i>	1.50
R » <i>caucasica</i>	1.50
R » <i>cathalinæ</i>	2.50
R » <i>Chamæiris</i>	1.—
R » <i>Cengialti</i>	2.50
R » <i>Clarkei</i>	2.50
R » <i>cristata</i>	2.50
R » <i>chrysographes</i>	2.50
H » <i>cuprea (fulva)</i>	1.50
R » <i>Cypriana</i>	2.50
R » <i>Delavayi</i>	2.50
R » <i>elegantissima</i>	2.50
R » <i>ensata</i>	0.75
~ R » <i>fimbriata</i>	1.—
R » <i>Florariensis</i>	1.50
V R » <i>Florentina</i>	0.75
+ O » <i>foetidissima</i>	0.75
» » à feuil. panach.	1.—
R » <i>Forresti</i>	2.50
~ » <i>Germanica</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» » <i>major</i>	2.50
» » type du Valais.	1.50

Plus de cent variétés étiquetées, à 1 fr., dans les meilleurs hybrides des jardins.

V R <i>Iris gigantea</i>	0.75
R » <i>graminea</i>	0.75
R » <i>hispanica</i>	0.50
R S » <i>Histrio</i>	1.—
R S » <i>histrioides</i>	1.—

¹ Pour la description des *Iris* lire le volume de MM. H. Correvon et H. Massé: *Les Iris dans les Jardins*.

	Fr. Cts		Fr. Cts
R Iris italica	0.50	R Jasione humilis	1.50
~ R » japonica I chinensis	1.—	R » perennis	1.—
Pa » Kämpferi (lævigata)	1.—	Campanules à fl. bleu lilas réunies en capitules ; soleil.	
R » Kamaonensis	2.50	Pa Juncus arcticus	1.—
R » Kharput	1.50	H » glaucus	0.50
R » Kochii	1.—	Kernera saxatilis, v. Cochlearia.	
R » Koroleyp. (H. Massé)	2.50	V R Kitaibelia vitifolia	0.75
T R » lacustris	1.50	~ R Kitchingia uniflora (nouveau)	2.50
R » loppii	0.50	V Kniphofia aloides (Tritoma Uvaria)	1.50
R » lusitanica	0.50	» caulescens (Trit. en arbre)	2.50
V R » lutescens	0.75	» grandiflora	1.50
V R » macrantha	1.—	» hybrida	1.—
R » Mandraliscæ	1.50	» nelsoni	1.50
R » Millesi	0.75	Pl. vivaces hautement décorative, larges épis dressés, rouge vif et jaune ; juillet-octobre.	
R » missouriensis	2.50	R S Lactuca perennis	1.—
R » musulmanica	2.50	» » à fl. blanches	1.50
R » olbiensis	0.75	R O Lamium Orvala	1.50
V R » orientalis	1.—	§ Lathyrus Boissieri	1.50
R » ochroleuca	1.50	§ » grandiflorus	1.50
R » notha	1.50	§ » latifolius	0.75
R S » orchioïdes	1.50	» » à fl. blanches	0.75
V R » pallida (la douz. 3 fr.)	0.50	» » à fl. roses	0.75
R » Pavonia	1.50	» White Pearl	1.—
Aq Pa » Pseudo-Acorus	0.50	§ » rotundifolius	1.50
» » fol. var.	1.50	R » tuberosus	1.—
R Bo » pumila (nain et précoce)	0.50	T Sp Laurentia tenella	2.50
» » var. fl. violet foncé	0.50	R Lavandula delphinensis (L. des Alpes)	0.75
» » var. fl. jaunes	0.50	~ » dentata	1.50
V R » pyrenaica	0.50	~ » multifida	1.50
S » reticulata	0.75	Bo R S » spica (latifolia)	1.50
R » Rhætica (rare et curieux)	2.50	» » alba	2.50
R S » rubro-marginata (rare)	2.50	~ » pedunculata	2.50
V R » sambucina	1.—	~ » Stœkas	1.50
R » sanguinea	1.50	Arom Bo Med vera (officinalis)	1.50
Pa » sibirica	1.—	» vera nana compacta	1.50
» » à fl. blanches	1.50	Les Lavandes sont très recherchées des maîtresses de maison pour parfumer le linge, les armoires, etc. Soleil et lieux secs ; bordures.	
R » Sissirinchium	1.—	~ Leonitis Leonurus	2.50
R » Sogdiana	1.50	R ~ Lavatera maritima	2.50
R » spuria	1.50	× Leiorhynchum buxifolium	2.50
R » squalens	1.—	R Lechea thymifolia	1.50
R » statellæ	1.—	Leontopodium alpinum, Etoile d'argent, Edelweiss	0.75
S » stylota (bleu, odorant, fleu- rissant tout l'hiver)	0.75	» forts pieds de deux ans	1.—
» stylota à fl. blanches	1.—	La cult. de l'étoile d'argent est facile ; soleil, rocher ou plate-bande si possible ; tenir sec l'hiver, diviser la touffe tous les deux ans. Pour l'avoir très blanche, il faut mettre du calcaire dans le sol.	
S » Suziana (Iris deuil)	1.50	Leontopodium alp., v. grandi fl.	2.50
R » subbiflora	1.50	Leontopodium alp., v. altaicum	2.50
R » Talischii	2.50	» alp., v. aragonense	2.50
R » Toachia	2.50	» » v. Himalayense	2.50
R » tectorum	0.75	» » v. leontopodioides	2.50
R » Tingitana	2.50	» » v. Lindavicum	1.50
S » tuberosa	1.—	» » v. sibiricum	1.50
R » transylvanica	2.50	» » v. Sikkimense	1.50
R » variegata	1.50	» » v. Tibeticum	1.50
V R » versicolor	1.—	» » v. Transylvanicum	1.50
R » virescens	1.—	R » japonicum	2.50
V R » virginica	1.—		
R V » Wilsoni	2.50		
R » Winogradoni	2.50		
V R » Xyphium	2.50		
V R » Xyphioides	2.50		
R S Isatis alpina	2.50		
Isopyrum thalictroides	0.75		

Jolie petite Renoncule tubéreuse précoce, à feuil-
lage fin et à fl. blanches ; mi-ombre ou sous bois.

	Fr. Cts
R <i>Leptinella dioica</i>	0.50
Leucanthemum, v. <i>Chrysanthemum</i> .	
R <i>Leucojum æstivale</i>	0.75
R » <i>pulchellum</i>	0.75
Pr R » <i>vernium</i> (nivéole) la douz, 2 fr.	0.50
R ^ <i>Leucophyta Brownei</i> (<i>Corail</i> <i>d'argent</i>)	2.50
R <i>Leuzea conifera</i>	1.50
V <i>Liatris psychostachya</i>	1.—
V » <i>scariosa</i>	1.—
V » <i>spicata</i>	1.—
R <i>Libertia ixioides</i>	2.50
V R <i>Lilium bulbiferum</i>	1.—
V » <i>candidum</i>	1.—
R » <i>carniolicum</i>	2.50
VR » <i>croceum</i>	1.—
R » <i>Jankæ</i>	5.—
R » <i>Martagon</i> (la douz. 5 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	5.—
R S » <i>pomponium</i> (<i>Martagon rou-</i> <i>ge vif, l'un des plus beaux</i> <i>Lis</i>)	2.50
R O » <i>pyrenaicum</i>	2.50
R <i>Limoniastum monopetalum</i>	1.50
Charmante petite <i>Statice</i> en arbuste de près d'un mètre de haut, se couvrant de fl. bleues pendant 7 à 8 mois. Soleil; abri.	
Aq <i>Limnanthemum nymphoides</i>	0.50
(Sorte de petit nénuphar jaune qui garnit rapide- ment un étang.)	
/// <i>Linaria equitriloba</i>	1.—
M /// <i>Linaria alpina</i> , à fl. roses	1.50
» » concolor	1.50
La <i>L. alp.</i> , l'une des plus gracieuses et des plus florifères d'entre les pl. de rocaïlles, réussit au soleil, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher; juin-septembre.	
R <i>Linaria anticaria</i>	0.75
R + » <i>cilicica</i>	0.50
/// O » <i>cymbalaria</i> , <i>Ruine de Rome</i> (la douzaine 2 fr.)	0.50
» » à fl. blanche	0.75
/// » <i>glareosa</i>	2.50
R /// » <i>hepaticifolia</i>	1.—
R » <i>italica</i>	2.50
R » <i>macedonica</i>	0.50
/// » <i>origanifolia</i>	0.75
+ /// » <i>pallida</i> (<i>Ruine de Naples</i>)	0.75
/// » <i>pilosa</i>	1.50
R » <i>purpurea</i>	0.75
/// + » <i>repens</i> (<i>striata</i>)	0.50
R » <i>triornitophora</i>	1.—
/// » <i>tristis</i>	0.75
/// » <i>villosa</i>	2.50
R V <i>Lindefolia spectabilis</i>	1.—
TO x + <i>Linnæa borealis</i>	1.50
O x » <i>canadensis</i>	2.50
R <i>Lynosyris vulgaris</i>	0.75
R <i>Linum alpinum</i> (bleu azur)	1.—
R » <i>austriacum</i>	0.50
R S » <i>campanulatum</i>	1.—
R S » <i>capitatum</i>	2.50

	Fr. Cts
R <i>Linum collinum</i>	1.50
R S » <i>flavum</i>	0.50
R » <i>extra-axillare</i>	2.50
R S » <i>hirsutum</i>	2.50
R S » <i>Lewisii</i>	1.—
R S » <i>maritimum</i>	1.—
R » <i>monogynum</i>	2.50
V R » <i>narbonense</i>	1.—
G V R » <i>perenne</i>	0.50
Pl. très florifère, qui donne ses abondantes fl. bleues tout l'été durant et jusqu'en novembre. Port gracieux; soleil.	
<i>Linum perenne album</i>	0.50
R » <i>salsoloides</i>	1.50
V R » <i>sibiricum</i>	0.50
R ^ » <i>trigynum</i>	2.50
/// » <i>tenuifolium</i>	1.—
R S » <i>viscosum</i>	1.50
+ ^ <i>Lippia canescens</i> , <i>L. repens</i>	0.50
^ <i>Lithospermum fruticosum</i>	2.50
R /// » <i>Frœbeli</i>	1.50
R O » <i>Gastoni</i>	2.50
/// » <i>graminifolium</i>	1.50
/// » <i>intermedium</i>	1.50
/// » <i>oleoides</i>	2.50
/// » <i>petraeum</i> (<i>Echium</i>)	1.50
R x » <i>prostratum</i>	1.—
» » Heavenly Blue	1.50
O R » <i>purpureo-cæruleum</i>	0.50
^ R » <i>rosmarinifolium</i>	2.50
Sp <i>Lloydia alpina</i> , <i>L. serotina</i>	2.50
H <i>Lobelia cardinalis</i> (type)	1.50
R V » <i>fulgens</i>	1.50
R Pa » <i>siphylitica alba</i> et type	0.50
R Pa » <i>Tupa</i>	1.50
Arom <i>Lophanthus anisatus</i>	0.75
<i>Loiseleuria</i> , voir <i>Azalea</i> .	
R <i>Lotus corniculatus</i>	0.50
O <i>Lunaria rediviva</i>	0.50
O <i>Luzula albida</i>	0.50
R » <i>lutea</i>	0.50
» <i>maxima fol. var.</i>	0.50
R <i>Lychnis alpina</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
V » <i>chalcedonica</i>	0.75
» » <i>alba</i>	1.50
Pa » <i>Floscuculi</i>	0.75
V » <i>coronaria</i> (<i>Coquelourde</i>)	0.50
R » <i>Flos Jovis</i>	1.—
» » à fl. blanches	1.50
R » <i>fulgens</i>	1.—
V R » <i>Haageana</i>	1.—
/// R » <i>Lagascæ</i>	1.—
R V Pr » <i>Viscaria</i>	0.75
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. doubles	1.—
R <i>Lysimachia atropurpurea</i>	1.—
H » <i>ciliata</i>	1.—
V H » <i>clethroides</i>	1.—
R » <i>Delavayi</i>	1.—
Pa » <i>ephemereum</i>	1.—
H Pa » <i>Henryi</i>	2.50
H R » <i>Lishangensis</i>	1.—

	Fr. Cts
± H <i>Lysimachia nemorum</i>	0.50
Pa ± » <i>nummularia</i> (Creeping Jenny)	0.50
R Pa » <i>numm. aurea</i>	0.50
Pa » <i>thyrsiflora</i>	1.—
H V » <i>verticillata</i>	0.75
Pa » <i>vulgaris</i>	0.75

L. nummularia est l'une des meilleures pl. tombantes; au cœur de Londres, on le voit retomber des fenêtres de 1 et 2 étages et se couvrir de fl. jaune brillant, de mai en septembre, très solide; craint seulement le sec et le trop grand soleil.

Pa <i>Lythrum Salicaria</i>	0.75
R <i>Malva moschata</i>	0.75
» <i>alba</i>	0.75
R <i>Malvastrum coccineum</i>	5.—
R <i>Mandragora officinalis</i>	2.50
R <i>Margyricarpus setosus</i>	1.50
± <i>Marrubium candidissimum</i>	1.50
R » <i>sericeum</i>	0.50
R » <i>velutinum</i>	1.50
R <i>Marshallia cespitosa</i>	1.50
~ <i>Matthiola fenestralis</i>	1.—
/// ± » <i>pedemontana</i>	2.50
R » <i>sinuata</i>	1.—
/// ± » <i>tristis</i>	2.50
/// ± » <i>Valesiaca</i>	2.50
O ± <i>Mayanthemum bifolium</i>	0.50
O ± » <i>canadense</i>	2.50
T ± Pa <i>Mazus pumilo</i>	0.75
T Pa » <i>rugosus</i>	0.75
O <i>Meconopsis cambrica</i>	0.75
» <i>cambrica</i> à fl. orangées	0.75
R » » à fl. pleines	2.50
O » <i>petiolata</i> (<i>Stylophorum</i>)	1.—
<i>Megasea</i> , v. <i>Saxifraga</i> .	
R <i>Melica altissima</i> (jolie graminée d'ornement)	0.50
Med Ar <i>Melissa officinalis</i> (Mélisse)	0.50
» <i>aurea</i>	1.50
R <i>Melittis Melyssophyllum</i>	0.75
Arom Med <i>Mentha citrata</i> (vraie Bergamotte ou Chartreuse)	0.50
Med <i>Mentha crispa</i>	0.50
Arom Med » <i>japonica</i>	0.50
» <i>piperita</i> (Menthe poivrée)	0.50
R ± n » <i>Requienii</i> (<i>Thymus corsicus</i>)	0.50
Aq <i>Menyanthes trifoliata</i> (Trèfle d'eau)	0.75
× <i>Menziesia empetrifolia</i>	5.—
× » <i>polifolia</i>	2.50
Pr R <i>Merendera Bulbocodium</i>	0.50
R O <i>Mertensia ciliata</i>	1.—
R O » <i>echioides</i>	2.50
O » <i>paniculata</i> (<i>sibirica</i>)	1.—
R O » <i>primuloides</i>	2.50
Med R <i>Meum athamanticum</i>	1.—
V R <i>Michauxia campanuloides</i>	1.—
R <i>Micromeria Douglasi</i>	1.—

Pl. aromatique à feuillage délicieusement odorant, à croissance rapide, à port traînant et de couleur vert clair, très agréable.

R <i>Micromeria croatica</i>	1.—
--	-----

	Fr. Cts
R <i>Micromeria cristata</i>	1.—
» <i>montana</i> (<i>Satureya montana</i>)	0.75
/// » <i>piperella</i>	1.50
R » <i>rupestris</i>	1.50

Petites Labiées propres pour les rochers ensoleillés; été; *M. rupestris*, jolie espèce à nombreuses fl. blanches, est très recommandable; *piperella* est une touffe de fl. rose vif.

H <i>Mimulus cardinalis</i> (fl. rouges)	0.75
» <i>cardinalis</i> (hybrides)	1.—
T » <i>Lewisii</i>	1.—
H » <i>luteus</i>	0.50
T ~ » <i>moschatus</i> (<i>Herbe au musc</i>)	1.—
T × » <i>primuloides</i>	2.50

Belles et brillantes Scrophularinées à fl. généralement grandes et belles; juin-octobre; humidité et mi-ombre; place abritée contre grands froids.

<i>Minuartia</i> = <i>Arenaria</i>	
R <i>Mirabilis multiflora</i>	1.50
/// <i>Mœhringia dasiphylla</i> (<i>Sedoides</i>)	2.50
/// O » <i>muscosa</i>	0.75

Délicieuse petite Cariophyllée à feuillage très fin, à fl. blanches en c. oix, très nombreuses; mai-octobre fissures d'un mur ou rocher, ombre ou mi-soleil; fraîcheur; préfère le calcaire.

/// <i>Mœhringia papulosa</i>	2.50
R /// » <i>pendula</i>	1.—
/// O » <i>Ponæ</i>	2.50
R <i>Molopospermum cicutarium</i>	1.50
R <i>Molucella spinosa</i>	1.—
V + <i>Monarda dydima</i> (thé d'Oswego)	1.—
» <i>dydima</i> Cambridge Scarlet	1.—
» » à fl. blanches	1.—
» <i>fistulosa</i> (<i>Basilic vivace</i>)	0.75
» <i>Florariensis</i> (rose superbe)	0.75
» <i>purpurea</i>	0.75
» <i>superba</i>	0.75

Très belles pl. à fl. élégantes et décoratives, à feuillage odoriférant, fleurissant de juillet en octobre; mi-ombre; bon sol sain; excellentes fl. pour bouquets. Le *M. dydima* a les fl. d'un rouge vermillon velouté très brillant; le *M. purpurea* les a d'un carmin vif et *Florariensis* beau rose. Ces pl. trop peu connues, méritent d'être dans tous les jardins.

V R <i>Morine longifolia</i>	1.—
R » <i>Kokamirica</i>	1.50
V <i>Montbretia crocosmiæflora</i>	0.50
R /// <i>Morisia hypogæa</i>	2.50
± <i>Muhlenbeckia axillaris</i>	1.—
± » <i>complexa</i>	1.—
± » <i>nana</i>	1.—
<i>Mulgedium alpinum</i>	1.50
» <i>Bourgæi</i>	1.50
R » <i>Plumieri</i>	1.50

Composées à fl. bleu violacé assez semblables à celles de la *Chicorée* sauvage très nombreuses, en grappes ou panicules plus ou moins étalées, décoratif; mi-ombre; pl. solides; mai-septembre.

R <i>Muscari comosum</i>	0.50
R » <i>moschatum</i>	1.—
R » <i>populueum</i>	1.—
R <i>Myosotis alpestris</i>	0.50
T ~ » <i>australis</i> (fl. jaunes)	2.50
R » <i>azorica</i>	1.—

	Fr. Cts
Pa <i>Myosotis palustris</i>	0.50
» » var. <i>semperflorens</i>	0.50
R » <i>Welwitschii</i>	1.—
O <i>Myrrhis odorata</i> (<i>Myrrhe</i>)	1.—
Narcissus biflorus	0.50
» <i>Bulbocodium</i>	0.50
» <i>Capax</i>	2.50
» <i>juncifolius</i>	0.50
» <i>poeticus</i> (des Avants)	0.50
» <i>pseudo-Narcissus</i>	0.50
» <i>radiiflorus</i>	0.50
Nardosmia fragrans, v. <i>Petasites</i>	
Nenuphar, v. <i>Nuphar</i> et <i>Nymphaea</i>	
R <i>Nardus stricta</i>	0.50
V <i>Nepeta macrantha</i>	1.—
Bo R » <i>Mussini</i>	1.—
R » <i>nuda</i>	1.—
H ~ <i>Nierembergia rivularis</i>	1.—
Excellente petite pl. naine et rampante, aux grandes fl. blanches se succédant pendant tout l'été et jusqu'en novembre.	
<i>Nigritella</i> , voir <i>Orchidées</i> .	
<i>Nuphar luteum</i>	1.50
<i>Nymphaea alba</i>	1.50
» <i>chromatella</i>	2.50
» <i>odorata</i>	2.50
et les Nénuphars à fl. rose, carmin, rose, jaune, etc, à	
R H <i>Obione portulacoides</i>	2.50
œillet Flor, v. <i>Dianthus semperflorens</i>	
R T <i>Oenothera caespitosa</i>	2.50
R » <i>Fraseri</i>	1.—
R » <i>missouriensis</i> (<i>macrocarpa</i>)	0.75
R » <i>pumila</i>	1.—
R » <i>rosea mexicana</i>	0.50
R » <i>serrulata</i>	1.50
± V » <i>speciosa</i>	1.—
Les Primevères du soir sont de vigoureuses et bonnes pl. vivaces et de roches; O. missour. est la meilleure des pl. rampantes, grand esd. jaune clair, mai-octobre; O. speciosa, à très grandes fl. blanc rosé à centre jaune, est une merveille de grâce et d'élégance, très solide et plutôt envahissante.	
O <i>Omphalodes Cappadocica</i>	2.50
R n /// » <i>Luciliae</i>	5.—
R » <i>nitida</i> (<i>O. Lusitanica</i>)	2.50
O » <i>verna</i>	0.50
» à fl. blanches	0.50
R <i>Onobrychis caput Galli</i>	1.—
R » <i>montana</i>	1.—
R » <i>petraea</i>	1.—
R » <i>saxatilis</i>	1.—
/// R <i>Ononis cenisia</i>	2.50
R » <i>fruticosa</i> , petit arbr., fl. ros.	1.50
R » <i>Natrix</i>	1.50
R » <i>rotundifolia</i>	1.50
R <i>Onosma armena</i>	2.50
R » <i>Bourgæi</i>	1.50
R » <i>Helveticum</i>	2.50
/// R » <i>rupestris</i>	2.50
/// » <i>stellulatum</i>	1.50
R s » <i>tauricum</i>	1.50

	Fr. Cts
O <i>Ophiopogon Jaburan</i>	0.50
» <i>japonicum</i> fol. var.	1.—
O » <i>spicatum</i>	0.50
<i>Opuntia</i> , v. <i>Cactées rustiques</i> .	
<i>Orchis</i> , v. <i>Orchidées rustiques</i> .	
/// ~ <i>Origanum Dictamnus</i>	2.50
R /// » <i>hybridum</i> (<i>Sypileum</i>)	2.50
R /// » <i>pulchrum</i>	2.50
Jolies Labiées au feuillage aromatique très parfumé chez <i>pulchrum</i> , qui a de belles fl. roses entourées de bractées vivement colorées. Soleil et sec. Juin-octobre.	
Pr <i>Ornithogalum nutans</i> (Etoile de Bethléem)	0.50
R <i>Orobis luteus</i>	1.50
R » <i>macrorrhizus</i>	1.50
» <i>niger</i>	0.50
R » <i>tuberosus</i>	0.50
R » <i>vernus</i> (sous-bois, lieux mi-ombragés, grands rochers)	0.50
R S <i>Ostrowskya magnifica</i>	2.50
R S <i>Othonna cheirifolia</i>	1.—
~ » <i>crassifolia</i>	1.—
O <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Pain de coucou</i>	0.50
R » <i>adenophylla</i>	2.50
/// R ~ » <i>atrosanguinea</i>	0.50
/// » <i>cernua</i>	0.50
R » <i>enneaphylla</i>	2.50
» » <i>rosea</i>	2.50
R Bo » <i>floribunda</i>	0.75
» » <i>alba</i>	0.75
R » <i>magellanica</i>	1.—
R ~ » <i>tetraphylla</i> (Trèfle à 4 feuilles)	0.75
R » <i>Tropaeoloides</i>	0.50
T × Pa <i>Oxycoccus macrocarpum</i>	2.50
T × Pa » <i>vulgaris</i>	2.50
R n <i>Oxyria dygina</i>	1.50
/// <i>Oxytropis campestris</i>	1.50
/// » <i>fœtida</i>	2.50
/// » <i>montana</i>	1.50
/// » <i>pilosa</i>	1.50
~ <i>Pachyphytum brevifolium</i>	2.50
± OBo <i>Pachysandra procumbens</i>	1.50
± OBo » <i>terminalis</i>	1.50
± /// n <i>Pæderota Ageria</i>	2.50
± /// n » <i>Bonarota</i>	2.50
~ <i>Pæonia albiflora</i>	2.50
» <i>abchastica</i>	2.50
» <i>corallina</i>	1.50
» <i>decora</i> (<i>Romanica</i>)	1.50
» <i>Delavayi</i>	2.50
» <i>lobata</i>	1.50
» <i>lutea</i>	2.50
» <i>mlokosiewski</i> (jaune soufre)	2.50
» <i>officinalis</i>	1.50
» <i>paradoxa</i>	2.50
» <i>peregrina</i>	1.50
» <i>Russi</i>	2.50
» <i>tenuifolia</i>	1.50
» » fl. pl.	1.50
» » <i>rosea</i>	2.50
» <i>triternata</i>	2.50
» <i>Veitchii</i>	2.50

	Fr. Cts
<i>Pæonia Wittmanniana</i>	2.50
Ce sont là les plus rares et les plus belles d'entre les Pivoines à fl. simples. Nous offrons en outre une collection de plus de vingt var. à fl. doubles ou pleines du PIVOINE DE CHINE à parfum de Rose, étiquetées, à 2 fr. 50 le pied.	
R <i>Pancratium maritimum</i>	2.50
V <i>Panicum virgatum</i> (Jolie graminée fine pour gerbes d'hiver).	1.—
/// R <i>Papaver alpinum</i> , type	1.—
Délicieuse petite pl. des pierres calcaires qui prod. des cent. de fl. légèrement odorantes, très gracieuses, de mai en automne; fentes rochers ou mur ou pl. terre, au mi-sol; se resème naturellement si l'on a soin de ne pas déranger le sol alentour. Demande sol léger, sableux, peu nourissant et bien drainé. Recommandé pour jardins de montagne et sols arides. On peut aussi le semer sur plate-bande.	
<i>Papaver alpinum</i> à fl. bl, jaunes, roses, rouge vif, rose très clair, jaune soufre; à fl. laciniées, etc..	
R O » <i>atlanticum</i>	0.50
V » <i>involucratum</i> (bracteatum)	1.50
C'est le superbe Pavot Géorgien avec fl. écarlate vif.	
/// <i>Papaver Kernerii</i>	2.50
R /// n » <i>nudicaule</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. rouges.	0.50
Voisin du <i>P. alpinum</i> , plus fort et plus solide; fl. très abondantes; mai-automne; lieux frais; l'une des meill. pl. pour rochers et pleine terre à mi-ombre.	
P <i>Papaver orientale</i> (Grand pavot vivace d'Orient)	0.75
R » <i>pilosum</i>	0.75
/// » <i>pyrenaicum</i>	2.50
/// » <i>rhæticum</i>	2.50
R » <i>rupifragum</i>	0.75
R » <i>spicatum</i>	0.75
R » <i>trinæfolia</i>	2.50
Les Pavots vivaces sont d'excell. pl. d'ornement, fleurissant abondamment et de cult. extra facile. Nous offrons la collection complète des Pavots vivaces d'Orient dans les teintes rose, endre, blanc, rose lilas, lilas foncé, rouge sang, rouge brun foncé, rouge orangé, rouge carmin, saumon, cramoisi, à fl. doubles, à fl. rouges striées de blanc, avec noms, au prix de 1 fr. 50 la pl. Ce sont d'entre les meilleures et les plus solides des pl. vivaces. Sol profond; soleil ou mi-soleil.	
R G <i>Paradisica Liliastrium, Lis de St-Bruno</i>	0.50
» var. <i>major</i>	1.—
O <i>Paris quadrifolia, Parisette</i>	1.50
T <i>Parnassia alpina</i>	1.50
T Pa » <i>asarifolia</i>	2.50
T » <i>palustris</i>	0.75
+ /// <i>Paronychia argentea</i>	0.50
/// » <i>macrosepala</i>	0.50
/// » <i>nivea</i>	0.50
R » <i>serpyllifolia</i>	0.50
Petites pl. saxatiles et ramp., au port absolument nain, aux fl. insignifiantes, entourées de bractées brillantes et souvent très belles; sol. et sec.	

	Fr. Cts
R /// <i>Parrya Menriesii</i>	1.—
R /// <i>Passerina calycina</i>	2.50
R /// » <i>dioica</i>	2.50
R /// » <i>nivalis</i>	2.50
R /// » <i>Tartouira</i>	2.50
R /// » <i>Thymelæa</i>	2.50
Délicieux petits arbuscules rampants voisin des Daphne.	
R <i>Peganum Harmala</i>	2.50
/// R <i>Pelargonium Endlicherianum</i>	2.50
R <i>Pelteria alliacea</i>	0.75
/// <i>Penthorum sedoides</i>	1.50
R <i>Pentstemon antirrhinoides</i>	1.50
V R » <i>arizonicus</i>	1.50
+ V » <i>barbatus</i> (<i>Chelone barb.</i>)	0.75
V » <i>Bardbury scarlet</i>	1.—
R ~ » <i>cordifolius</i>	1.50
R » <i>diffusus</i>	0.75
+ » <i>digitalis</i>	0.75
+ R » <i>heterophyllus</i>	2.50
R » <i>humilis</i>	1.50
R /// » <i>linarioides</i>	2.50
M /// » <i>Menziesii</i>	2.50
V R » <i>Newburyi gem</i>	1.50
V R » <i>ovatus</i>	0.75
V R » <i>pubescens</i>	0.75
V R » <i>pygmaeus</i>	1.50
R » <i>Scouleri</i>	1.50
V R » <i>venustus</i>	0.75
V R » <i>unilateralis</i>	0.75
Les Pentst. sont des pl. vivaces de très grande valeur; florifères et élégants. Ils nous donnent tout l'été durant, des fleurs excellents comme décoration et pour la fl. coupée. Culture facile.	
+ V <i>Pentstemon hybrides</i> , dans les diverses var. existant; ce sont d'excell. pl. d'été et d'automne qu'il faut, chez nous, protéger un peu l'hiver. Gdes fl. très ornementales.	1.50
+ <i>Perovskya atriplicifolia</i>	2.50
Très belle pl. arbustive à longs épis de fl. de Lavedes; à feuilles argentées aromatiques.	
R <i>Petalostemon candidus</i>	1.50
R » <i>tenuifolius</i>	1.50
O <i>Petasites albus</i>	1.—
~ » <i>fragrans, Héliothrope d'hiv.</i>	0.50
Fleurit tout l'hiver en plein air s'il est à l'abri de la neige; parfum intense de vanille; lieux abrités contre gros soleil et trop grands froids; envahissant.	
~ » <i>giganteus</i>	1.—
O » <i>niveus</i>	0.50
Pa ~ » <i>ochroleucus</i>	0.50
Pa ~ » <i>officinalis</i>	0.50
Tous ces tussillages sont envahissants et propres à garnir et à orner, grâce à leur grand et beau feuillage, les lieux frais et mi-ombragés.	
R <i>Phaca alpina</i>	1.50
R » <i>astragalina</i> (<i>Astragalus alpinus</i>).	1.50
R » <i>Australis</i>	1.50
R » <i>frigida</i>	1.50

Fr. Cts

Bo	Phalaris arundinacea, v. fol. var. (Herbe vaudoise)	0.50
V	Phlomis alpina	1.—
V	» chrysophilla	1.50
V	» fruticosa	1.50
R	» Herba-Venti	2.50
R	» Lychnitis	1.50
+ V	» Samia	0.50
±	Phlox amœna	0.50
±	» divaricata (P. Canadensis)	0.50
R	» nivalis	0.50
R ///	» Douglasi	2.50
V	» paniculata	0.75
+	» nombr. var. horticoles	0.75
+	» reptans	0.50
+	» setacea	0.50
	» » à fleurs blanches	0.50
	» » G. F. Wilson	0.50
±	» stellaria	0.50
±	» subulata	0.50
	» » var. alba	0.50
	» » var. Daisy Hill	0.50
	» » var. Nelsoni	0.50
	» » var. Starlight	0.50
	» » var. The Bride	0.50
	» » var. Vivid	0.50
±	» verna	1.50

Sauf le P. paniculata et ses variétés qui sont des pl. vivaces très populaires, ces Phlox appartiennent aux pl. naines et rases, de rochers ou de bordures et réclament le soleil.

V R	Phygelius capensis	1.—
✓	Physalis Alkekengi, Coqueret, Al- kékenge	0.50
✓	» Franchetti	0.50
O //	Physochlaina orientalis	1.50
+ V	Physostegia virginiana	0.75
	» virginiana alba	0.75
R	Phyteuma Charmelli	0.50
///	» comosum	2.50
///	» hemisphœricum	2.50
R	» limonifolium	1.—
Pr R	» orbiculare	1.—
///	» pauciflorum	2.50
///	» Scheuchzeri	1.—
// R	» spicatum, Raiponce	0.50
R	» Wagneri	1.50
✓ V	Phytolacca decandra	1.50
T	Pinguicula alpina, Grassète	0.50
T	» grandiflora	1.50
T	» longifolia	1.50
T	» Reuteri	1.50
T	» vulgaris	0.50

Pl. insectivores, à feuil. visqueux qui attire, prend et absorbe les mouches; racines presque nulles, à l'automne les feuilles disparaissent et la vie de la plante est renfermée dans un pseudobulbe qu'il faut surveiller afin que les oiseaux ne le mangent pas et qu'il faut enterrer dans le sol moussu où on le cultive. Humidité constante et, si possible, eau suintant au travers du sol ou de la roche; mai-août.

R	Plagius ageratifolius	1.50
R	Plantago argentea	1.—
✓	Plantago Cynops	0.50

Fr. Cts

V	Platycodon autumnale	1.—
+ V R	» grandiflorum	0.75
	» » album	0.75
	» » fl. duplex	1.50
+ V R	» Mariesi	0.75
	» » album	0.75

Ce sont des Campanules tuberculeuses à belles et grandes fleurs bleu foncé ou blanches. (Août-octobre). Cult. très facile.

±	Plumbago Larpentæ	0.75
---	-----------------------------	------

Pl. basse et traçante, à fl. d'un bleu intense, assez semblable au Gentiana verna; mi-ombre; août-novembre.

R	Podanthum (Camp.) canescens	1.—
O	Podophyllum Emodi	1.50
O	» peltatum	1.50
	Polemonium cœruleum, Valériane grecque	0.50
	» à fl. blanches	0.50
	» carneum	1.50
	» filicinum	2.50
	» flavum	1.50
	» humile	1.50
	» reptans	1.50
	» reptans roseum	2.50
	» Richardsoni	1.—

Bonnes pl. vivaces de pleine terre ou de rocailles, fleurissant de mai en septembre, à fl. généralement bleues, odorantes, disposées en panicules dressées; fraîcheur; soleil ou mi-soleil. Mellifères.

R	Polygala Balansæ	5.—
R	» calcarea	1.50
± O	» Chamæbuxus	1.—
± O	» Rhodoptera, à fl. rose carmin	1.50
///	» rupestris	2.50
± O	» Vayredæ (carmin et jaune)	2.50
// R	Polygonatum biflorum	1.—
R	» giganteum	2.50
// R	» multiflorum (Sceau de Salomon)	1.—
// R	» verticillatum	1.—

Pour sous-bois et lieux ombrés.

±	Polygonum affine, P. Brunonis	0.75
R	» alpinum	2.50
V	» amplexicaule	0.75
Aq Pa	» amphybium	0.75
R Pa	Polygonum Bistorta (Bistorte)	0.75
R V	» campanulatum	1.50
±	» capitatum	0.75
V	» cuspidatum (Sieboldi)	0.75
±	» Emodi	2.50
R	» Ephedroides (equisetiforme)	2.50
V	» molle (polystachium)	1.—
± ///	» romanum	1.50
—	» multiflorum	1.50
V	» Sacchalinsense	0.50
R	» sphærostachyum	2.50
R n	» viviparum	1.—
V	» Weyrichii	1.—
Aq	Pontederia cordata	1.50
Aq	Potamogeton natans	1.—
R	Potentilla adjarica	0.75
R	» abschasicus	0.75

		Fr. Cts
+ R	Potentilla alba	0.75
R	» alchemilloides	1.—
R	» alpestris	1.—
+ R	» ambigua	1.—
Pa	» anserina	1.—
///	» argentea	0.75
R	» argyrophylla	1.—
+ R V	» atrosanguinea	0.75
R	» aurea	0.75
R	» Baldensis	1.—
R ///	» caulescens	1.50
R	» cinerea	1.50
R	» Dahurica	2.50
R	» Delavayi	1.50
R ///	» Fenzlii	2.50
R	» fragiformis	1.—
R	» Friedrichseni (<i>Dahurica</i> × » <i>Fruticosa</i>)	2.50
M	» frigida	2.50
H	» fruticosa	1.50
	» » var. <i>arbuscula</i>	2.50
R	» <i>grandiflora</i>	0.75
R	» <i>Hippiana</i>	0.75
+ R	» hybrida (<i>alba</i> × <i>fragariact.</i>)	0.75
R	» incanescens	0.75
R	» Kurdica	1.—
R	» micrantha	0.75
R M	» minima	2.50
R	» montenegrina	1.—
R	» multifida	0.75
+ R	» Nepalensis	0.50

Fl. d'un rose intense, de mai jusqu'en hiver.

R	» nevadensis	1.50
R + ///	» nitida	1.50
M	» nivea	1.50
R	» Purdoni	2.50
R ///	» pygmæa	2.50
R	» pyrenaica	0.75
R	» recta	0.50
+	» <i>reptans</i> à fl. pl.	0.50
///	» <i>rupestris</i>	0.75
H T	» Salesoviana	1.—
R	» sanguisorbæfolia	2.50
///	» saxifraga	2.50
R	» speciosa	1.—
R	» striatissima	1.—
R	» taurica	2.50
T Pa	» <i>tormentilla</i>	1.—
R	» Valderia	1.50
R	» Veitchii	2.50
R	» verna	0.75
R	» Visiani	1.50
V	» Willmottiae	1.—

Les Potentilles sont de bonnes pl. gracieuses et florifères, de cult. généralement facile: été et automne; les esp. à feuillage argenté, qui brunit souvent à l'automne et se bronze délicatement, sont très décoratives. Les Pot. atrosanguinea, Nepalensis, Willmottiae sont d'entre les meilleures pl. vivaces.

T	Pratia angulata	2.50
	O <i>Prenanthes purpurea</i>	0.50

PRIMEVÈRES

I. GROUPE DES ESPÈCES SAXATILES:

	Fr. Cts
/// n	Primula allionii 2.50
Fortes pl. bien enracinées, aiment les fentes de rochers abritées contre l'humidité.	
R ///	Primula <i>Auricula</i> (type alpin) 0.75
	La douzaine 6.—
	» <i>Auricula</i> var. <i>gigantea</i> 2.50
	» » var. <i>marginata</i> 2.50
R ///	n » <i>calycina</i> (<i>glaucescens</i>) 1.50
R n	» <i>carniolica</i> 1.50
R n	» <i>Clusiana</i> 2.50
/// R n	» <i>Cottia</i> , carmin très vif 2.50
///	» <i>crenata</i> 2.50
R n	» <i>deorum</i> 2.50
/// n	» <i>Facchini</i> 1.50
/// M	» <i>glutinosa</i> 2.50
/// R n	» <i>hirsuta</i> (la douz. 6 fr.) 0.75
R	» <i>integrifolia</i> 0.75
R	» <i>Kitaibaliana</i> 2.50
/// R n	» <i>latifolia</i> (<i>graveolens</i>) 1.50
/// R n	» <i>marginata</i> (Primev. en arbr.) 1.50
M R	» <i>minima</i> 1.—
///	» <i>muretiana</i> 2.50
///	» <i>Palinuri</i> 2.50
/// n	» <i>pedemontana</i> 2.50
R n	» <i>spectabilis</i> 1.50
/// n	» <i>tirolensis</i> 2.50
R ///	n » <i>villosa</i> 2.50
	» <i>viscosa</i> , v. <i>P. hirsuta</i>
R n	» <i>Wulfeniana</i> 1.—

Tous ces Pr. fleurissent de mars en mai et préfèrent une position horizontale, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher, au mi-soleil.

II. GROUPE DES ESPÈCES AIMANT LA FRAICHEUR:

T H	Primula	algida	1.50
T H	»	anisodora	2.50
T H	»	auriculata	2.50
R H	»	Beesiana	0.75
R H	»	Bulleyana × Japonica	1.50
R H	»	Burmanica	2.50
R H	»	Bulleyana	0.75
R H	»	Bullesii	0.75
R	»	Cockburniana	1.50
T H	»	darialica	1.50
T H	»	darialica	1.50
H	»	Edina	2.50
T Pa H	»	farinosa (la douz. 6 fr.)	0.75
	»	farinosa grandiflora	2.50
R H	»	glycosma	1.50
T H Pa	»	frondosa	1.50
T H	»	grandis	2.50
T H	»	involutrata	1.50
R H Pa	»	japonica	0.75
	»	» alba	0.75
	»	» sanguinea	0.75
H R	»	helodoxa	2.50
T H	»	longiflora	1.—
T H	»	luteola	2.50
T H	»	polyantha (voir veris)	
T H	»	Lyssadell	1.50
T H	»	pulveralenta	0.75

	Fr. Cts
T H Primula Poissonni.	1.50
H Pa " rosea	0.75
" " var. <i>grandiflora</i> splendens.	1.50
R H " Schmidtii	1.—
O " Sikkimensis	1.50
R H " sibirica	2.50
R H T " " var. <i>chinensis</i>	2.50
R H " sphaerocephala	2.50
R H Ha " vittata	1.50
T " Wilsoni	2.50

Ces espèces préfèrent un sol poreux et légèrement humide, une situation fraîche et mi-ombragée.

III. GROUPE DES ESPÈCES SILICICOLES ET DE CULTURE SPÉCIALE :

R × Primula capitata (vrai)	1.50
R × " capitellata	2.50
" " floribunda	1.—
" " var. <i>Isabellina</i>	1.50
" " Forbesi	1.—
" " var. <i>Rubin</i>	1.50
R × " Forresti	2.50
~ R " Kewensis	1.50
× " lischiangensis	2.50
R × " megasæfolia	2.50
~ " malacoides	1.—
R × " muscarioides	2.50
R " mollis	1.50
× " Mooreana	1.50
× " munroi	2.50
R × " oblanceolata	2.50
O " patens	2.50
× " pulchelloides	2.50
× " purpurea	2.50
× " septemloba	2.50
× O Sieboldi, <i>Cortusoides-amaena</i>	1.50
× " Veitchi	1.50

Il faut à cette catégorie un sol dépourvu de calcaire, terre de feuilles et sable granitique et une exposition mi-ombragée.

IV. GROUPE DES ESPÈCES DE PLEINE TERRE :

// R Pr Primula acaulis (la douz. 5 fr.)	0.50
" " acaulis var. à fl. bleues	1.50
" " var. <i>alba plena</i>	1.50
" " lutea pl.	1.50
" " rosea pl.	1.50
" " purpurea pl.	1.50
" amœna	1.50
" Cachemiriana	0.75
" " alba	0.75
" " grandiflora	1.—
" " purpureascens	1.—
" Columnæ (<i>suaveolens</i>)	1.—
" cœrulea (<i>Primevère bleue</i>)	1.50
" cortusoides	0.75
" denticulata	0.75
Pr // R " elatior	0.50
" " major	0.75
" " splendens	1.—
R " goldlaced	0.75
R " Helenæ	0.75

	Fr. Cts
Primula Juliae	1.—
" officinalis (<i>Cowslip</i>)	0.50
" " à fl. rouges	0.50
" " var. <i>duplex</i>	2.50
R " saxatilis	0.75
T " Theodora	0.75
" veris, <i>Primevère des jardins</i>	0.50

C'est la primevère multicolore des vieux jardins, que les Anglais ont amenée à un haut degré de perfectionnement et dont nous possédons les variétés anglaises (la douzaine, 4 fr.). Tout ce groupe de Pr. comprend des espèces extrêmement robustes qui réussissent dans tout terrain frais et sain. Elles préfèrent un sol riche et profond et la mi-ombre.

Prunella grandiflora	0.50
" laciniata (fl. blanches)	0.75
" " à fl. magenta	1.—

Labiées rampantes et propres à garnir les lieux secs.

R Psoralea bituminosa	1.50
R " macrostachys	1.50
± /// Pterocephalus Parnassi	0.75
// R Pulmonaria angustifolia	0.75
// R " rubra	1.—
R S Putoria calabrica	1.50
Pulsatilles, v. <i>Anémones</i>	
Arom V Pycnanthemum lanceolatum	0.75
R Pyrethrum argenteum	2.50
R " densum	2.50
R S Pyrethrum macrophyllum	0.75
+ V " roseum	0.75
" " nombr. var. à fl. simples ou doubl.	1.—
± // " Tschihatscheffii (la douz. 4 fr.). La meil. pl. gazonnante pour lieux arides et secs	0.50
Sp Pyrola rotundifolia	1.—
Sp " uniflora	2.50
/// n Ramonda Nataliæ	1.50
/// n " pyrenaica	0.75
/// n " serbica	1.50

RENONCULES

(ESPÈCE PLEINE TERRE)

R Pa H Ranunculus aconitifolius	1.—
R " Chaerophyllos	1.—
R " Ficaria alba	2.50
R " " grandiflora	0.50
R S " Illyricus	0.75
Aq " Lingua	1.—
R S " monspeliacus	0.75
R " montanus	0.75
~ " reptans fl. pl. (<i>bouton d'or</i>)	0.75
R " Serbicus	0.75

ESPÈCES SAXATILES A PORT BAS

R///n Ranunculus alpestris	1.50
R S " amplexicaulis	1.50
R n " (<i>Callianthemum</i>) anemonoides	2.50
R n " bilobus	2.50

	Fr. Cts		Fr. Cts
R S Ranunculus calandrinoides . . .	5.—	R S Ruta montana . . .	2.50
R n » crenatus . . .	2.50	+ Sagina Linnæi . . .	0.50
Sp M » glacialis . . .	2.50	+ » procumbens . . .	0.50
R S » gramineus . . .	1.—	Aq Sagittaria japonica . . .	1.—
R S » hybridus . . .	2.50	Aq » sagittæfolia (Flèche des	1.50
R S » parnassifolius . . .	1.50	eaux) . . .	1.50
R S » pyrenæus . . .	1.50	~ + Salicornia fruticosa . . .	2.50
R n » (Callianthemum) rutifolius .	1.50	Salix herbacea . . .	1.50
R n » Seguieri . . .	1.50	» polaris . . .	1.50
R S » Thora . . .	1.—	» reticulata . . .	1.50
R n » Traunfellneri . . .	2.50	» retusa . . .	1.50
R n » uniflorus . . .	2.50	» serpyllifolia . . .	1.50
R /// Raoulia australis . . .	1.50	Saules nains et rampant sur le sol ou entre les	
R Reineckia carnea . . .	1.—	rochers (à peine quelques centimètres de hau-	
R Reseda glauca . . .	1.—	teur). Bons pour les lieux frais des rocaïles, au	
V R Rhazia orientalis . . .	2.50	Nord.	
V Med Rheum officinale . . .	1.50	~ + Salpichroa rhomboidea . . .	1.—
V » Palmatum . . .	1.50	R Salvia æthiopis . . .	1.50
/// n Rhodiola linifolia . . .	1.—	R » argentea . . .	1.50
» linifolia var. rubra . . .	1.50	V » azurea . . .	1.50
/// n » rosea (Sedum Rhodiola) .	1.—	R » cypriana . . .	1.—
R x /// Rhododendron chamæcistus .	5.—	V ~ » coccinea . . .	1.50
R x O » ferrugineum (pl. fortes) .	5.—	R » crispa . . .	1.—
Absolument acclimatées et couvertes de boutons.		O R » glutinosa . . .	1.—
R O x » Rhododendron hirsutum .	5.—	V » officinalis . . .	0.75
Pl. acclimatées, couvertes de boutons à fl. et dont		» » à fl. blanches . .	1.—
la reprise est certaine.		» » à fl. rose vif . .	1.—
Pa Rodgersia æsculifolia . . .	2.50	» » grandiflora . .	1.75
Pa » pinnata . . .	2.50	» » tricolor . . .	1.—
Pa » podophylla . . .	1.—	Pr R » pratensis . . .	1.—
Pa » tabularis . . .	2.50	V ~ » patens . . .	1.50
O R Rohdea japonica . . .	2.50	R » Przewalsky . . .	1.—
T Romanzoffia Sitchensis . . .	1.50	R S » ringens . . .	1.50
T » suderdorfi . . .	1.50	R S » scabiosæfolia . . .	2.50
T » unalaschensis . . .	1.50	Arom R » Sclarea . . .	1.—
R V Romneya Coulteri . . .	2.50	R » taraxacifolia . . .	1.50
» trychocalyx . . .	5.—	T + Samolus repens . . .	2.50
» hybrida . . .	5.—	T Pa » Valerandi . . .	0.50
Ce sont les fameux Pavots en arbre à grandes fl.		O Sanguinaria canadensis . . .	0.75
blanc pur de Californie ; ils réussissent chez nous		Pa Sanguisorba canadensis . . .	0.75
au grand soleil, dans un lieu abrité ; sol léger,		R Pa » Vallistellina (dodecandra) .	1.—
caillouteux si possible.		O Sanicula europæa . . .	0.75
R S Rosmarinus officinalis . . .	1.50	Arom S Santolina chamæparissus . .	1.—
R S » prostratus . . .	1.50	R » pectinata . . .	1.—
~ R Rubia tinctoria . . .	1.—	S R » rosmarinifolia . . .	1.—
T R Rubus arcticus (Framboise du		Excellentes pl. buissonneuses pour constituer des	
Nord) . . .	1.—	bordures.	
~ » australis . . .	2.50	R S Saponaria bellidifolia (fl. jaunes)	1.—
T x » chamæmorus . . .	5.—	R S » Boissieri . . .	1.50
R ~ » Saxatilis . . .	1.50	/// S » cæspitosa (fl. rose pâle) .	1.50
V Rudbekia fulgida . . .	0.75	/// » cypria . . .	2.50
» hirta . . .	0.75	/// S » lutea (fl. jaunes) . . .	1.50
» laciniata . . .	0.75	R ~ /// » ocymoides (la douz. 5 fr.)	0.50
» fl. pl. . .	0.75	» » à fl. blanches . .	1.—
» maxima . . .	2.50	» » à fl. rose clair .	1.—
» nitida . . .	1.50	» » splendens . . .	1.—
» purpurea . . .	1.—	Pr ~ » officinalis . . .	0.75
» speciosa . . .	0.75	Saponaria officinalis à fl. pleines .	1.—
» Pl. vivaces de grande valeur.		/// » pulvinaris . . .	1.50
R S Ruellia ciliosa . . .	1.50	/// S » Weinmanniana . . .	1.50
R S Ruta angustifolia . . .	1.50	T Sarracenia purpurea . . .	2.50
R S » graveolens . . .	1.—	/// Satureya diffusa . . .	1.50
/// + » patavina . . .	1.50	/// » intermedia . . .	1.50
		/// » montana . . .	0.75

	Fr. Cts
R <i>Satureya orontia</i>	1.50
/// » <i>pygmæa</i>	1.50
/// » <i>repanda</i>	1.—
/// » <i>stenophylla</i>	1.50
Petites Labiées aromatiques en arbustes nains et serrés, aux rameaux et aux fl. innombrables. Été et automne. Pl. mellifères.	
V <i>Saussurea alpina</i>	1.50
R H » <i>discolor</i>	2.50
R » <i>pygmæa</i>	2.50

SAXIFRAGES

SECTION BERGENIA OU MEGASEA ;

V R <i>Saxifraga ciliata</i>	0.75
V R » <i>cordifolia</i>	0.75
V R » <i>Delavayi</i>	1.50
V R » <i>ligulata</i>	0.75
R » <i>orbicularis</i>	1.—
V R » <i>Stracheyi</i>	1.50

Espèces à larges feuilles épaisses. Fl. rose vif, ramassées en grappes serrées et apparaissant de très bonne heure au printemps. Mi-ombre : sol ordinaire.

SECTION BORAPHYLA ;

///TM <i>Saxifraga Clusii</i>	2.50
T R » <i>Hieracifolia</i>	2.50
T » <i>nivalis</i>	1.50
T » <i>stellaris</i>	1.50

Fraîcheur et humidité. Mi-soleil ; avril-mai.

SECTION CYMBALARIA ;

<i>Saxifraga Cymbalaria</i>	0.50
» <i>Huettiana</i>	0.50

Pl. bisannuelles à fl. nombreuses, d'un jaune vif ; feuillage luisant ; petites touffes très élégantes fleurissant de mai en automne ; ombre et fraîcheur.

SECTION DACTYLOIDES (MOUSSEUX) :

H <i>Saxifraga adscendens (aquatica)</i>	1.—
R ± » <i>ajugæfolia</i>	1.—
Bo ± » <i>Allionii (Kingii, densa)</i>	0.50
T M » <i>androsacea</i>	1.50
± BoR » <i>atropurpurea</i>	0.75
± R » <i>cæspitosa (la douz. 5 fr.)</i>	0.50
± R » <i>Camposii</i>	2.50
± Bo » <i>canaliculata</i>	1.—
R » <i>capitata</i>	1.50
± BoR » <i>cervicornis</i>	1.—
/// » <i>coniferæ</i>	2.50
/// » <i>Corbariensis</i>	2.50
/// n » <i>cuneata (très beau et raris.)</i>	5.—
± R n » <i>decipiens (la douz. 5. fr.)</i>	0.50
» » <i>grandiflora</i>	0.50
± Bo » <i>exarata</i>	1.—
± Bo » <i>geranioides</i>	0.75
/// » <i>Gibraltarica</i>	1.50
± R » <i>glabella</i>	2.50
/// » <i>globulifera</i>	1.50
Bo R » <i>Guildford Seedling (rose v.)</i>	1.—
± » <i>hypnoides (la douz. 5 fr.)</i>	0.50
» » <i>var. purpurea</i>	0.75

	Fr. Cts
/// n <i>Saxifraga intricata</i>	1.—
/// n » <i>Iratiana</i>	1.—
± R » <i>Lloyd-Edward</i>	0.75
R » <i>Madeirensis</i>	2.50
/// n » <i>moschata</i>	1.—
/// n » <i>muscoïdes</i>	1.—
/// n » <i>nervosa</i>	1.—
± R » <i>oranensis</i>	2.50
R » <i>palmata</i>	1.—
/// n » <i>pedemontana</i>	2.50
/// n » <i>planifolia</i>	2.50
/// n » <i>Prenja</i>	2.50
/// n » <i>Prostii</i>	1.—
± R » <i>pubescens</i>	1.50
± R » <i>purple mantle</i>	0.75
/// » <i>recurvifolia</i>	1.50
± R » « <i>Red Admiral</i> »	0.75
± R » <i>Rhei</i>	0.75
» » <i>rosea</i>	0.75
» » <i>Scarlet Gem</i>	0.75
» » <i>Schöne von Ronsdorf</i>	0.75
/// n M » <i>Seguieri</i>	2.50
R » <i>Sponhemica</i>	1.—
± Bo » <i>trifurcata (la douz. 5 fr.)</i>	0.50
/// » <i>varians</i>	1.—
± R » <i>Wilkommiana</i>	1.50

Espèces cespitueuses, à rameaux étalés sur le sol qu'ils recouvrent à la manière des mousses ; feuillage finement divisé ; fl. blanches ou roses. Ombre ou mi-soleil. Excellentes pour bordures. Mai-juin.

SECTION DIPTERA :

~ <i>Saxifraga cuscutæformis</i>	2.50
~ » <i>cortusaefolia</i>	5.—
~ » <i>Fortunei</i>	1.50
~ » <i>madida</i>	5.—
~ » <i>sarmentosa</i>	0.50
H » <i>Tellimoides</i>	1.50

Pl. chinoises ou japonaises, mi-rustiques ; position abritée ; mi-ombre.

SECTION EUAIZOONIA :

<i>Saxifraga aizoon (la douz. 5 fr.)</i>	0.50
» <i>aizoon atropurpurea</i>	1.50
» » <i>brevifolia</i>	0.50
» » <i>Churchilli</i>	0.50
» » <i>cultrata</i>	0.50
» » <i>Malyi</i>	1.—
» » <i>minima</i>	1.—
» » <i>robusta</i>	1.—
» <i>altissima</i>	1.—
» <i>australis</i>	1.—
» <i>balcana</i>	1.—
» <i>Burnati</i>	2.50
» <i>carniolica</i>	1.—
» <i>cartilaginea</i>	1.—
» <i>catalaunica</i>	1.50
» <i>cochlearis (vrai)</i>	0.75
» <i>cotyledon (pyramidalis)</i>	0.75
» » × <i>aizoon</i>	2.50
» <i>crustata</i>	1.—
» <i>dalmatica</i>	1.—
» <i>elator</i>	0.75

	Fr. Cts
<i>Saxifraga flavescens</i>	1.—
» <i>florariensis</i>	1.50
» <i>Forsteri</i>	1.—
» <i>Gaudini</i>	1.—
» <i>Hostei</i>	0.75
» <i>major</i>	0.75
» <i>Kolenatiana</i>	1.50
» <i>Lagroveana</i>	1.50
» <i>lanceolata</i>	1.—
» <i>Lantoskana</i>	0.75
» <i>lingulata</i> (Alberti)	1.—
» <i>linguæformis</i>	1.—
» <i>longifolia</i>	1.—

Position verticale entre les pierres d'une rocaïlle
ou dans un vieux mur; soleil.

<i>Saxifraga longifolia</i> cotyledon	2.50
» <i>longifolia</i> cochlearis	2.50
» <i>major</i>	2.50
» <i>var. angustifolia</i>	2.50
» <i>mac Nabiana</i>	1.—
» <i>mutata</i>	0.75
» <i>notata</i>	0.50
» <i>pectinata</i>	0.75
» <i>Portæ</i>	0.75
» <i>Probyni</i> (cochlearis minor)	2.50
» <i>recta</i>	0.75
» <i>rhætica</i>	0.75
» <i>rosularis</i>	0.75
» <i>sempervivum</i>	0.75
» <i>speciosa</i>	2.50
» <i>splendida</i>	2.50
» <i>Stabiana</i>	0.75
» <i>Stenoglossa</i>	0.75
» <i>sturmiana</i>	0.75
» <i>Vochinensis</i>	0.75
» <i>Zeileborii</i>	0.75
» <i>Zimmererii</i>	2.50

Habitant les lieux rocheux et ensoleillés des montagnes de l'Europe; feuillage durci par la chaleur crustacé, d'un vert grisâtre; grande résistance qui permet de les considérer comme très robustes; soleil, rocher, muraille; le *S. mutata* seul recherche un sol frais, et, tandis que les fl. des autres espèces sont blanches, souvent pointillées de pourpre, celles-ci sont d'un rouge brunâtre.

SECTION TRISTYLEA :

<i>Saxifraga florulenta</i> (pieds très forts, en éch. très enra- cinés	10.—
Pieds de force moyenne	5.—
Semis de 3 à 5 ans	2.50

Cette pl., la merveille des Alpes-Maritimes, a été longtemps considérée comme étant de culture impossible. Nous en offrons ici des pieds parfaitement enracinés dont la reprise est sûre.

SECTION HIRCULUS :

<i>Saxifraga Hirculus</i>	1.50
-------------------------------------	------

Pl. marécageuses, aimant la tourbe et les lieux frais;
fl. jaune-orange; mai-juillet.

SECTION KABSCHIA :

<i>Saxifraga alberti</i>	0.75
» <i>ambigua</i>	0.75

	Fr. Cts
<i>Saxifraga apiculata</i>	0.75
» <i>micrantha</i>	2.50
» <i>aretioides</i>	1.50
» <i>Bertoloni</i>	2.50
» <i>Boydei</i>	2.50
» <i>Borissii</i>	1.50
» <i>Boryi</i>	2.50
» <i>Burseriana</i>	0.75
» <i>grandiflora</i>	2.50
» <i>caesia</i>	2.50
» « Cherry tree »	1.50
» <i>coriophylla</i>	1.50
» <i>Desoulavayi</i>	1.50
» <i>diapensioides</i>	2.50
» <i>Elisabethæ</i>	1.—
» <i>Eudoxiana</i>	1.50
» <i>Ferdinand Coburgii</i>	2.50
» <i>Friedrich-Augusti</i>	2.50
» <i>Grisebachii</i>	2.50
» <i>Haagii</i>	1.—
» <i>Hedraantha</i>	2.50
» <i>juniperifolia</i>	1.50
» <i>Kinlayi</i>	1.50
» <i>Kyrillii</i>	1.50
» <i>Kotschyi</i>	2.50
» <i>lævis</i>	1.—
» <i>Ludoviciana</i>	1.50
» <i>luteo-purpurea</i>	2.50
» <i>luteo-viridis</i>	2.50
» <i>macedonica</i>	2.50
» <i>mædia</i> (calyciflora)	2.50
» <i>marginata</i>	1.50
» <i>Obristii</i>	2.50
» <i>ochroleuca</i>	1.50
» <i>Olympica</i>	2.50
» <i>Paulinæ</i>	1.—
» <i>Petraschii</i>	1.50
» <i>porophylla</i>	1.50
» <i>pseudo-Kotschyi</i>	1.50
» <i>pseudo-santa</i>	1.50
» <i>pungens</i>	1.50
» <i>Rocheliana</i>	1.50
» <i>purpurea</i>	1.50
» <i>Salomoni</i>	1.—
» <i>Scardica</i>	1.50
» <i>obtusa</i>	2.50
» <i>sancta</i>	1.50
» <i>splendens</i>	1.50
» <i>Spruneri</i>	1.50
» <i>squarrosa</i>	1.50
» <i>Thessalica</i>	1.50
» <i>Tombeanensis</i>	2.50
» <i>Valdensis</i> (vrai)	2.50
» <i>Vandelli</i>	2.50

C'est ici la plus jolie, la plus intéressante section du genre; petites touffes en boules ou en pelotes, à feuillage serré, composées d'une infinité de petites rosettes serrées les unes contre les autres, et émettant au printemps (de mars en juin suivant les espèces) un gr. nombre de fl. blanches ou jaunes. Murs ou fentes de rochers; demi-ombre.

SECTION MISCOPETALUS :

<i>Saxifraga Heucherifolia</i>	1.—
» <i>lasiophylla</i>	1.—

	Fr. Cts
<i>Saxifraga repanda</i>	1.—
» <i>rotundifolia</i>	0.75
» <i>Taygetæa</i>	1.50

Feuilles généralement orbiculaires, dentées sur les bords; fl. blanches ponctuées de pourpre et disposées sur des tiges paniculées; hautes de 10 à 80 cm. Roc ou pl. terre; fraîcheur et mi-ombre; mai-août.

SECTION PELTIOPHYLLUM:

<i>Saxifraga Peltata</i>	1.—
------------------------------------	-----

Belle et grande espèce paludéenne de Californie; feuell. en parasol retourné, mesurant parfois 60 cm. de diamètre, à fl. roses disposées en groupe au sommet d'une tige épaisse, charnue et garnie de poils bruns, haute de près d'un mètre. Sol profond et très poreux, frais et riche en humus. Mai-juin.

SECTION PORPHYRION:

<i>Saxifraga augustana</i>	2.50
» <i>biflora</i>	2.50
» <i>blepharophylla</i>	2.50
» <i>lilacina</i>	2.50
» <i>oppositifolia</i>	1.—
» » à fl. blanches.	1.—
» » var. <i>grandiflor</i>	2.50
» » var. <i>latina</i>	2.50
» » var. <i>pyrenaica</i>	2.50
» <i>retusa</i>	2.50

Touffes naines et étalées sur le sol, formant des gazons plus ou moins épais et denses, se recouvrant en mars-avril-mai de fl. sessiles d'un rose vif, carmin foncé ou clair, suivant les espèces et produisant le plus charmant effet. Roc., mur au nord ou au mi-soleil.

SECTION ROBERTSONIA:

<i>Saxifraga apennina</i>	1.50
» <i>Andrewsi</i> (Guthriana).	1.—
» <i>Colvillei</i>	1.—
» <i>cuneifolia</i>	0.75
» <i>Geum</i>	0.75
» <i>hirsuta</i>	0.75
» <i>melvillei</i>	1.—
» <i>primuloides</i>	1.50
» <i>umbrosa</i> (London Pride) la douzaine 5 fr.	0.50

Bonnes plantes connues sous le nom de « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches pointillées de pourpre et disposées en panicules dressées; feuillage très élégant. Excellentes pour bordures ou pour garnir les niches de roch. à l'ombre ou au mi-soleil. Mai-juin.

SECTION TRACHYPHYLLUM:

<i>Saxifraga aspera</i>	1.—
H » <i>arizoides</i>	1.—
» » <i>aurantiaca</i>	2.50
» <i>bronchialis</i>	1.—
» <i>Brunoniana</i>	1.50
» <i>bryoides</i>	1.—
» <i>Stelleriana</i>	1.—
» <i>tenella</i>	1.—
» <i>tricuspidata</i>	2.50

Pl. cespitueuses formant des touffes, à feuilles velues-ciliées ou nues, à fl. blanches, jaunes ou rougeâtres, recherchant les sols humides et mi-ombragés; roc. Mai-août.

	Fr. Cts
<i>Scabiosa caucasica</i>	0.75
» » <i>alba</i>	0.75
» <i>cretica</i>	2.50
» <i>graminifolia</i>	0.75
» <i>lucida</i>	1.—
» <i>lyratifolia</i> , fl. grenat	1.—
» <i>ochroleuca</i> , fl. jaunes	1.—
» <i>Olgae</i>	1.50
» <i>silenifolia</i>	1.—

Le Scab. Caucas. est une pl. superbe, à grands capitules bleu lilas ou blanc pur, propre à orner les plates-bandes et excellente pour la fleur coupée; *graminifolia* a les feuilles argentées et les capitules lilas clair; c'est une excell. pl. de rocail.; qui fleurit tout l'été et l'automne, et tapisse sur un grand espace. Sol profond; mi-soleil; toutes recherchent le soleil et les situations plutôt sèches.

R <i>Schivereckia podolica</i>	0.50
R <i>Schizostylis coccinea</i>	1.—
R <i>Scilla amena</i>	0.50
R » <i>autumnalis</i>	0.50
» <i>bifolia</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» » <i>alba</i>	0.75
» » <i>rosea</i>	0.75
R » <i>campanulata</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
R » <i>italica</i>	0.50
R » <i>japonica</i>	1.50
R » <i>Lilio-Hyacinthus</i>	0.75
R » <i>nutans</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» » <i>alba</i> (la douz. 3 fr.)	0.50

Le Sc. nutans (blue bell) est la meilleure des pl. pour tapisser le sous bois. Il couvre en Angleterre de vastes étendue sous le bois le plus épais et produit au printemps, un tableau magnifique par ses myriades de fl. azur agréablement parfumées.

R <i>Scilla sibirica</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
R » <i>verna</i>	1.—
R <i>Scorzonera rosea</i>	1.50
R <i>Scrophalaria trifoliata</i>	1.—
R <i>Scutellaria alpina</i>	0.75
» <i>alpina</i> à fl. blanches	1.—
R » <i>altissima</i>	0.50
R » <i>Baikalensis</i>	1.50
R » <i>macrantha</i>	1.50
R » <i>orientalis</i>	1.—
R » <i>splendida</i>	1.50
R » <i>tuberosa</i>	1.50

Labiées à fl. plus ou moins grandes et nombreuses en épis plus ou moins serrés; pl. généralement touffues et basses; Sc. alpina est une plante naine et saxatile pouvant constituer des bordures; S. orientalis, pl. cespitueuse à fl. jaunes; mai-septembre; soleil.

SEDUM

I. ESPÈCES NAINES, CESFITEUSES ET ESSENTIELLEMENT SAXATILES:

<i>Sedum acre</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» <i>acutifolium</i>	0.50
» <i>Alamosanum</i>	2.50
» <i>Alberti</i>	0.50
» <i>albescens</i>	0.50
» <i>album</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» » var. <i>virens</i>	0.50
» <i>Allantoides</i>	2.50

	Fr. Cts
<i>Sedum altissimum</i>	0.50
» <i>Anacampseros</i>	0.75
» <i>anglicum</i>	0.75
» <i>annuum</i>	1.—
» <i>anopetalum</i> (<i>ochroleucum</i>)	0.50
» <i>asiaticum</i>	1.50
» <i>athoum</i>	0.75
» <i>atratum</i>	1.—
» <i>Boloniense</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» <i>brevifolium</i>	1.—
» <i>Byrichianum</i>	1.—
» <i>Chauveaudi</i>	1.50
» <i>cœruleum</i> (annuel)	0.50
» <i>corsicum</i>	1.—
» <i>crista-Galli</i>	1.—
» <i>crassipes</i>	0.75
» <i>cupressoides</i> (nouveau)	2.50
» <i>cyaneum</i>	0.75
» <i>dasiphyllum</i> (jolie esp. mur.)	0.75
» <i>divergens</i>	1.—
» <i>Douglasi</i>	1.50
» <i>elegans</i>	0.75
» <i>Eversii</i>	0.75
» <i>Ellacombianum</i>	1.—
» <i>elongatum</i>	1.—
» <i>erythræum</i>	1.—
» <i>farinosum</i>	2.50
» <i>Forsterianum</i>	0.75
» <i>gemmiferum</i>	2.50
» <i>glaucum</i>	0.75
» » <i>aureum</i>	0.75
» <i>gypsicolum</i>	1.—
» (<i>Villadia</i>) <i>Guatemalensis</i>	2.50
» <i>hirsutum</i>	1.50
» <i>indicum</i>	1.50
» <i>Kamtschaticum</i>	0.75
» » <i>fol. var.</i>	1.—
» <i>laconicum</i>	0.75
» <i>Laggeri</i>	1.—
» <i>Liebmannianum</i>	1.—
» <i>longipes</i>	1.50
» <i>Lydium</i>	0.75
» <i>magellense</i> (<i>Olympicum</i>)	0.75
» <i>mellitulem</i>	2.50
» <i>multiceps</i>	1.50
» <i>murale</i>	0.75
» <i>nicaense</i>	0.75
» <i>obtusatum</i>	1.—
» <i>oppositifolium</i>	1.—
» <i>Oreganum</i>	1.—
» <i>Pachyphitum</i>	2.50
» <i>pallidum</i>	0.50
» <i>Palmeri</i>	1.—
» <i>pilosum</i>	1.50
» <i>Pittoni</i>	2.50
» <i>Potosinum</i>	2.50
» <i>pruinatum</i>	1.—
» <i>primuloides</i>	0.75
» <i>pulchellum</i> (fl. rose clair)	1.50
» <i>reflexum</i> (<i>montanum</i>) la douz. 3 fr.	0.50
» <i>retusum</i>	0.75
» <i>rupestre</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» <i>Sarmentosum</i>	1.—

	Fr. Cts
<i>Sedum Semenowii</i> (<i>umbilicus</i>)	1.50
» <i>Sempervivum</i>	1.50
» <i>sexangulare</i>	0.50
» <i>Sieboldi</i> (type)	1.—
» <i>spathulifolium</i>	2.50
» <i>spurium</i> (la douz. 3 fr.)	0.50
» » <i>splendens</i>	0.50
» <i>Stahlii</i>	1.50
» <i>stoloniferum</i> (belles fl. r.)	1.—
» <i>ternatum</i>	2.50
» <i>Treleasii</i>	2.50
» <i>turkestanicum</i>	1.—
» <i>Valerianoides</i>	1.50
» <i>varicolor</i>	1.50
» <i>Verloti</i>	0.50
» <i>Woodwardi</i>	1.50
» <i>Yosomitense</i>	1.50
» <i>Yunnanense</i>	1.50

Tous ces Orpins à fl. jaunes, blanches ou roses, sont d'entre les plus solides et les meilleures pl. pour garnir les rochers et les murs au soleil ou les pentes arides. Ils fleurissent longtemps et résistent aux plus fortes sécheresses.

II. ESPÈCES À TIGES DRESSÉS, FORMANT DES TOUFFES PLUS OU MOINS ÉLEVÉES :

<i>Sedum Aizoon</i>	1.—
» <i>atrosanguineum</i>	1.50
» <i>carpathicum</i>	1.—
» <i>dendroideum</i>	1.50
» <i>fabaria</i>	0.75
» <i>latifolium</i>	0.75
» <i>Maximowiczii</i>	0.75
» <i>maximum</i>	0.75
» <i>Middendorffianum</i>	0.75
» <i>populifolium</i> (pet. arb. dres.)	1.—
» <i>Rhodiola</i> (<i>Rhodiola rosea</i>)	1.—
» <i>rubricaule</i>	1.—
» <i>spectabile</i>	0.75
» » <i>atropurpureum</i>	1.—
» » <i>nanum</i>	1.50
» » <i>splendens</i>	1.50
» <i>telephioides</i>	0.75
» <i>Telephium</i>	0.75
» » <i>var. purpurescens</i>	0.75

Ces espèces sont fortes et solides, généralement très flor., à fl. roses, jaunes ou blanches, et propres à garnir les grands rochers et les plates-bandes ; soleil ou mi-soleil.

Selaginella, v. au chap. Fougères.

<i>Sempervivum</i> ¹ <i>acuminatum</i>	1.—
» <i>admontensis</i>	1.—
» <i>affine</i>	0.75
» <i>aizoon</i>	0.75
» <i>albernelli</i>	0.75

¹ Nous avons collectionné depuis 45 ans toutes les espèces et variétés de *Semperviva* qu'il nous a été possible de rencontrer dans les jardins ou dans la nature. Malheureusement la nomenclature de ce genre si embrouillé est très compliquée. Nous venons de publier une étude de genre dans laquelle nous avons résumé les observations faites depuis près d'un demi-siècle et avons cherché à établir une nomenclature exacte en attendant que la monographie que prépare M. R. Hamet de Paris, paraisse. — Voir l'annonce sur la liste de nos ouvrages.

	Fr. Cts		Fr. Cts
<i>Sempervivum albidum</i>	0.75	<i>Sempervivum Funkii</i>	0.75
» <i>allionii</i> (la douz. 5 fr.) . . .	0.75	» <i>Gaudini</i> (<i>grandiflorum</i>) . .	0.75
» <i>alpestre</i>	0.75	» <i>glaucum</i>	0.75
» <i>alpinum</i>	0.75	» <i>globiferum</i>	0.75
» <i>ambiguum</i>	0.75	» <i>graecum</i>	1.50
» <i>anomalum</i>	0.75	» <i>Greeni</i>	1.50
» <i>arachnoideum</i>	0.75	» <i>Guillemotti</i>	0.75
» <i>arenarium</i>	0.75	» <i>Hausmanni</i>	0.75
» <i>arvernense</i>	0.75	» <i>Haynaldi</i>	0.75
» <i>assimile</i>	0.75	» <i>helveticum</i>	1.50
» <i>atlanticum</i>	0.75	» <i>heterotrichum</i>	1.—
» <i>atropurpureum</i>	0.75	» <i>Heufelii</i>	1.—
» <i>atroviolaceum</i>	0.75	» <i>hirtum</i>	0.75
» <i>Aureggi</i>	0.75	» <i>hirtum raripilum</i>	1.50
» <i>autracum</i>	0.75	» <i>Hillebrandti</i>	1.—
» <i>Belladonna</i>	1.50	» <i>hispanicum</i>	1.50
» <i>barbulatum</i>	0.75	» <i>hispidulum</i>	1.50
» <i>blandum</i>	0.75	» <i>Hookeri</i>	1.—
» <i>Boissieri</i>	0.75	» <i>Hoppeanum</i>	1.50
» <i>Boulangeri</i>	0.75	» <i>Hostei</i>	1.50
» <i>Bourgeanum</i>	0.75	» <i>humile</i>	1.—
» <i>Boutignanum</i>	0.75	» <i>Huteri</i>	1.—
» <i>Braunii</i>	0.75	» <i>hybridum</i>	0.75
» <i>brevifolium</i>	0.75	» <i>inaperatum</i>	1.50
» <i>bryoides</i>	0.75	» <i>jubatum</i>	0.75
» <i>Bungeanum</i>	0.75	» <i>juratense</i>	0.75
» <i>Burnati</i>	0.75	» <i>Kapaornikense</i>	0.75
» <i>calcaratum</i>	0.75	» <i>Kochii</i>	1.50
» <i>calcareum</i> (<i>Californicum</i>) . .	0.75	» <i>Kapaornikense</i>	0.75
» <i>canescens</i>	0.75	» <i>Laggeri</i>	0.75
» <i>carniolicum</i>	1.50	» <i>Laharpii</i>	0.75
» <i>Caucasicum</i>	0.75	» <i>Lamottei</i>	0.75
» <i>Chaboisseaui</i>	0.75	» <i>latifolium</i>	0.75
» <i>Chavini</i>	2.50	» <i>Lazurinum</i>	0.75
» <i>Christii</i>	0.75	» <i>Lehmanni</i>	0.75
» <i>ciliatum</i> (<i>ciliosum</i>)	0.75	» <i>leucanthum</i>	1.50
» <i>cinarescens</i>	2.50	» <i>lezurinum</i>	1.50
» <i>Clusianum</i>	1.—	» <i>longobardum</i>	1.50
» <i>Comolii</i>	0.75	» <i>lugubris</i>	1.50
» <i>commutatum</i>	1.—	» <i>Luxemburg</i>	1.50
» <i>Corni di Canzo</i>	0.75	» <i>metalliculum</i>	1.50
» <i>cornutum</i>	0.75	» <i>Mettenianum</i>	0.75
» <i>Cottetti</i>	2.50	» <i>Moggrigei</i>	0.75
» <i>crassicaule</i>	0.75	» <i>montanum</i>	0.75
» <i>crassifolium</i>	0.75	» <i>Morellianum</i>	0.75
» <i>cupreum</i>	0.75	» <i>murale</i>	0.75
» <i>cuspidatum</i>	1.50	» <i>Murithi</i>	0.75
» <i>debile</i>	0.75	» <i>Neideri</i>	2.50
» <i>decipiens</i>	1.50	» <i>Neilreichii</i>	0.75
» <i>decorum</i>	0.75	» <i>nigrum</i>	0.75
» <i>Delassoiei</i>	1.50	» <i>obtusatum</i>	1.50
» <i>Delponti</i>	1.—	» <i>obtusifolium</i>	1.50
» <i>dichotomum</i>	0.75	» <i>ornatum</i>	0.75
» <i>Dœllianum</i>	0.75	» <i>pallescent</i>	1.50
» <i>dolomiticum</i>	0.75	» <i>pannonicum</i>	1.50
» <i>elegans</i>	0.75	» <i>parviflorum</i>	0.75
» <i>excellens</i>	1.50	» <i>parvulum</i>	0.75
» <i>Fauconnetti</i>	0.75	» <i>patens</i>	0.75
» <i>Ferrieri</i>	1.50	» <i>pennicellatum</i>	0.75
» <i>fimbriatum</i>	0.75	» <i>penninum</i>	0.75
» <i>filiferum</i>	0.75	» <i>piliferum</i>	0.75
» <i>flagelliforme</i>	0.75	» <i>Piedoyanum</i>	1.50
» <i>Fontanæ</i>	0.75	» <i>pilosella</i>	0.75
» <i>frigidum</i>	0.75	» <i>Pittonii</i>	2.50

	Fr. Cts
<i>Sempervivum Pomelii</i>	0.75
» <i>Powellii</i>	0.75
» <i>praestabile</i>	0.75
» <i>pseudo-Wulfenii</i>	1.50
» <i>pulchellum</i>	0.75
» <i>pumilum</i>	1.50
» <i>puniceum</i>	1.50
» <i>putriferum</i>	0.75
» <i>pyrenaicum</i>	0.75
» <i>Reginae Amaliae</i>	0.75
» <i>Requienii</i>	0.75
» <i>Rhaeticum</i>	0.75
» <i>Rhodanicum</i>	0.75
» <i>robustum</i>	0.75
» <i>Royana</i>	0.75
» <i>rubellum</i>	0.75
» <i>rubicundum</i>	0.75
» <i>rubrum</i>	0.75
» <i>Rudeni</i>	0.75
» <i>rupestre</i>	0.75
» <i>rupicolum</i>	0.75
» <i>ruthenicum</i>	0.75
» <i>sabaudum</i>	0.75
» <i>sanguineum</i>	0.75
» <i>saratense</i>	1.50
» <i>Scherzerianum</i>	1.50
» <i>Schlehani</i>	0.75
» <i>Schnittspahni</i>	0.75
» <i>Schottii</i>	0.75
» <i>Seguieri</i>	0.75
» <i>serotinum</i>	1.50
» <i>serpyllifolium</i>	0.75
» <i>soboliferum</i>	0.75
» <i>sordidum</i>	1.50
» <i>speciosum</i>	0.75
» <i>spinulifolium</i>	0.75
» <i>stenopetalum</i>	1.50
» <i>Studeni</i>	0.75
» <i>Styriense</i>	1.50
» <i>tectorum, Joubarbe</i> (la douz. 2 fr.)	0.50
» <i>tenellum</i>	0.75
» <i>Theobaldi</i>	0.75
» <i>Thomayeri</i>	0.75
» <i>Thomsoni</i>	1.50
» <i>Tissieri</i>	0.75
» <i>tomentosum</i>	0.75
» <i>triste</i>	0.75
» <i>turkestanicum</i>	0.75
» <i>Valesiacum</i>	0.75
» <i>Velenowskyi</i>	0.75
» <i>Verloti</i>	0.75
» <i>ventosicolum</i>	1.50
» <i>violacens</i>	1.50
» <i>Viestense</i>	1.50
» <i>Webbianum</i>	0.75
» <i>Wulfenii</i>	0.75
» <i>Zelebori</i>	0.75

Les Joubarbes sont extrêmement précieuses pour la garnit. de roc. et de vieux murs, comme aussi pour faire des bordures ou des décor. dans les plates-bandes. Ce sont les plus solides d'entre toutes les pl. et on en cultive des collections en godets, en vases japonais, etc., sur les fenêtres ou balcons; elles s'accommodent de toutes les

situations et leurs jolies fl. mais surtout leur feuillage à l'aspect de petits artichauts, les font rechercher par beaucoup d'amateurs. Il y a un plaisir très grand à les collectionner et à les cultiver.

Plusieurs des noms indiqués ci-dessus proviennent de collections horticoles et ne sont pas des espèces types. Tous appartiennent à des formes caractérisées.

SENECIO

ESPÈCES NAINES ET ALPINES :

	Fr. Cts
R S <i>Senecio abrotanifolius</i>	0.75
R S » <i>adonifolius</i>	0.75
R S » <i>carniolicus</i>	1.50
R S » <i>incanus</i>	1.50
/// » <i>leucophyllus</i>	2.50
R S » <i>tyrolensis</i>	1.50
/// » <i>uniflorus</i>	2.50

ESPÈCES MONTAGNARDES A PORT PLUS ÉLEVÉ :

R S <i>Senecio aurantiacus</i>	1.50
V » <i>clivorum</i>	1.—
R H » <i>cordifolius</i> (subalpinus)	1.50
V » <i>Doria</i> (macrophyllus)	1.—
R S » <i>Doronicum</i>	0.75
O » <i>Jacquinianus</i>	1.—
R » <i>pulcher</i>	2.50
R » <i>Tournefortii</i>	2.50
V » <i>Veitchianus</i>	1.50
V » <i>Wilsonianus</i>	1.50
R <i>Serratula nudicaulis</i> (rare)	2.50
R S <i>Seseli caespitosum</i>	1.—
R S <i>Sideritis Eubaea</i>	1.—
R S » <i>hyssopifolia</i>	1.—
R S » <i>Taurica</i>	1.50

Labiées aux fl. jaunes, excellentes pl. mellifères; soleil.

SILÈNES

I. ESPÈCES ALPINES, NAINES ET CESPITEUSES :

R /// <i>Silene acaulis</i>	1.—
» » <i>acaulis</i> à fl. blanches	1.50
» » <i>var. bryoides</i> (elon- gata)	1.50
» » <i>var. Correvoniana</i> (la même à fl. très doubles)	2.50
R///n <i>Silene alpestris</i>	0.75
» <i>var. fleurs doubles</i>	1.50
R » <i>bosniaca</i>	2.50
/// » <i>campanula</i>	1.50
R /// » <i>ciliata</i>	1.50
/// S » <i>cordifolia</i>	2.50
R /// n » <i>Elisabethæ</i>	2.50

La plus belle des Silènes; grandes fl. carmin à pétales incisés. Mi-soleil.

R /// <i>Silene exscapa</i>	1.—
/// S » <i>legionensis</i>	1.50
R » <i>Lerchenfeldiana</i>	1.—
R /// » <i>maritima</i>	0.75
» » à fl. pleines	1.—
/// n » <i>Monachorum</i> (espèce minus.)	1.—

	Fr. Cts
R /// <i>Silene multicaulis</i>	1.50
R » <i>pharmaceifolia</i>	2.50
n » <i>pudibunda</i>	1.—
R /// » <i>Pumilio</i>	1.50
/// n » <i>pusilla</i> (aime la fraîcheur)	1.—
/// n » <i>quadrifida</i> »	1.—
R » <i>Reichenbachiana</i>	1.—
R » <i>rupestris</i> (craint la chaux)	0.75
R /// » <i>Saxifraga</i>	0.75
Bo R /// » <i>Schafta</i> (la douz. 5 fr.)	0.50
/// » <i>Tommasiniana</i>	1.50
/// » <i>Valesia</i> (rampante et stolonifère)	1.—
R /// » <i>Zawadskyi</i>	0.75

II. ESPÈCES A TIGES DRESSÉES

<i>Silene fimbriata</i>	1.—
» <i>fruticosa</i>	1.—
» <i>nutans</i>	1.—
» <i>paradoxa</i>	1.—

Ces esp. vont indifféremment sur les roc. ou dans la pleine terre; soleil.

<i>Silphium albiflorum</i> (rarissime)	10.—
» <i>dissectum</i> (vrai)	2.50
» <i>laciniatum</i> (<i>Herbe du Pilote</i>)	1.50
» <i>perfoliatum</i> (<i>Herbe au com-pas</i>)	1.—
» <i>terebinthinaceum</i>	1.50

Plantes vivaces de grande envergure.

R <i>Sisyrinchium anceps</i>	0.50
O × <i>Smilacina stellata</i>	1.—
R <i>Sobolewska clavata</i>	1.—
H R <i>Solanum dulcamara</i> , Douce-amère	1.—
» <i>Sainclairii</i> (Pomme de terre-pygmée)	1.50
<i>Soldanella alpina</i> (la douz. 6 fr.)	0.75
» <i>minima</i>	2.50
» <i>montana</i>	2.50
» <i>pusilla</i>	2.50

Les Sold. fleurissent bien si l'on a soin de leur donner une position fraîche mais ensoleillée; il leur faut l'air humide, en février-mars, alors que leurs boutons se forment et se développent; cultiv. dans du Sphagnum, elles fleurissent très bien.

<i>Solidago alpestris</i> (<i>Verge d'or</i>)	0.75
» <i>arctica</i>	0.75
» <i>canadensis</i>	0.50
» <i>graminifolia</i>	0.50
» <i>Lillei</i> , aromatique	1.50
» <i>reflexa</i> (mellifère 1 ^{er} ordre)	0.75
» <i>rigidiscula</i>	0.75
» <i>Shortii</i>	0.75
» <i>spectabilis</i>	1.50
» <i>virginiana</i>	1.50

Pl. vivaces fleurissant à l'automne, en panaches jaunes; très mellifères, surtout *reflexa*.

— <i>Sphæralcea munroana</i>	1.50
T <i>Spigelia marylandica</i>	2.50
O <i>Spiræa Aruncus</i> (<i>Reine des Bois</i>)	1.—
R S » <i>cæspitosa</i>	1.—
Pa » <i>filipendula</i>	0.75
» » à fl. doubles	1.—
» » à feuil. panach.	1.—

	Fr. Cts
Pa <i>Spiræa gigantea</i> (<i>Kamtschatica</i>)	1.—
Pa » <i>palmata</i>	1.—
R » <i>Ulmaria</i> (<i>Reine des prés</i>)	0.75
» » à fl. doubles	1.—
Pa » <i>venusta</i> (à fl. rose vif)	1.—
— <i>Stachys coccinea</i>	1.50
+ R /// » <i>corsica</i>	1.50
R » <i>glutinosa</i>	1.50
Bo » <i>lanata</i> (la douz. 2 fr.)	0.50
R ± » <i>lavandulæfolia</i>	1.—
R » <i>rupestris</i> , très mellifère	1.—
R S <i>Stæhelinia unifluculosa</i>	2.50
/// <i>Statice bellidifolia</i>	1.—
/// » <i>globulariæfolia</i>	1.—
V » <i>Gmelini</i>	1.—
V » <i>latifolia</i>	1.—
— R » <i>Limoniastrum</i>	1.50
/// » <i>Limonium</i>	1.—
/// » <i>minuta</i>	2.50
R » <i>serbica</i>	1.—
/// R » <i>tatarica</i>	1.—
R » <i>virgata</i>	1.—

Toutes réclament le grand soleil.

ESPÈCES CANARIENNES NON RUSTIQUES:

— <i>Statice arborescens</i>	1.50
— » <i>fruticans</i>	1.50
— » <i>macrophylla</i>	1.50
— » <i>Perezi</i>	1.50
R <i>Sternbergia lutea</i> (la douz. 5 fr.)	0.50
R S <i>Stipa gigantea</i>	1.50
» <i>pinnata</i> (panache valaisan)	1.50
R <i>Stockesia cyanea</i>	1.50
O × <i>Streptopus amplexifolius</i>	2.50
Aq <i>Stratiotes aloides</i>	1.50
R <i>Suæda fruticosa</i>	2.50
R <i>Succisa pratensis</i>	0.75
H <i>Swertia longifolia</i>	2.50
T » <i>perennis</i>	0.50
R <i>Symphyandra Armena</i>	2.50
R » <i>Hoffmanni</i>	1.—
R » <i>pendula</i>	2.50
» <i>Wanneri</i> , v. <i>Campanula</i>	
H <i>Symphytum bulbosum</i>	0.50
H » <i>officinale</i> , <i>Consoude officinale</i>	0.50
O <i>Synedesis aconitifolia</i> (rare)	2.50
× <i>Synthiris reniformis</i>	2.50
§ O <i>Tamus communis</i>	1.50
R <i>Tanacetum argenteum</i>	2.50
V » <i>Balsamita</i> (<i>Toute bonne</i>)	1.—
V Ar » <i>boreale</i>	1.—
V » <i>vulgare</i> (<i>Tanaisie odorante</i>)	0.50
» » var. <i>crispum</i>	0.50
/// n <i>Telekia speciosissima</i> (vrai)	2.50
/// S <i>Telephium imperati</i>	1.—
/// S » <i>orientale</i>	1.50
R /// <i>Teucrium aureum</i> (vrai)	1.—
+ /// RS <i>Chamaedrys</i> (<i>Germandrée</i>) (la douzaine 2 fr.)	0.50
R S » <i>flavum</i>	1.—
R » <i>intermedium</i>	1.—
R » <i>massiliense</i>	1.—
R S » <i>lucidum</i>	1.—

	Fr. Cts
R /// <i>Teucrium marum</i> (Herbe aux chats)	1.50
R /// ± » <i>montanum</i>	0.75
R S » » <i>*orientale</i> (vrai)	0.75
R /// » » <i>polium</i>	0.75
R ± » » <i>pseudo-chamædrys</i>	0.75
± BoR » » <i>pyrenaicum</i>	0.75
R » » <i>Requienii</i>	1.—
R <i>Thalictrum alpinum</i>	1.—
/// » » <i>adiantifolium</i>	1.—
R » » <i>anemonoides</i>	1.—
O // » » <i>aquilegifolium</i> , <i>Pigamon des bois</i>	0.75
R » » <i>chelidoni</i>	1.—
R » » <i>cornuti</i>	1.—
R V » » <i>Delavayi</i>	1.50
R » » <i>dioicum</i>	1.50
R V » » <i>diptercarpum</i>	1.50
/// » » <i>elegans</i>	1.—
R » » <i>Fendleri</i>	1.—
H » » <i>flavum</i>	1.—
/// » » <i>fœtidum</i>	1.—
R /// » » <i>macrocarpum</i>	2.50
/// » » <i>minus</i>	0.75
R O » » <i>orientale</i>	2.50
R » » <i>petaloideum</i>	1.50
/// » » <i>saxatile</i>	0.75
R » » <i>tuberosum</i>	2.50

Charmanes Renonculacées aux feuillages élégants, rappelant, chez les espèces naines, les *Adiantum* qu'ils remplacent fréquemment pour les bouquets parce qu'ils offrent sur ces délicates fougères l'avantage de durer très longtemps. Le *Th. aquilegifolium* est l'une des mell. plantes pour sous-bois ou pour orner les bords des taillis, les grands rochers, etc.

V <i>Thermopsis montana</i>	1.50
M <i>Thlaspi cepæfolium</i>	2.50
R /// » » <i>Jankæ</i>	1.—
M » » <i>limosellæfolia</i>	2.50
M /// » » <i>rotundifolium</i>	1.50
R /// <i>Thymus australis</i>	1.—
R » » <i>capitatus</i>	1.50
± Bo// » » <i>citriodorus</i>	0.75
» » » <i>aurea</i> var.	0.75
» » » <i>argentea</i> var.	0.75
± R // » » <i>coccineus</i> (latinus)	0.75
R /// » » <i>ericæfolius</i>	0.75
/// » » <i>Herba Barone</i> (de Corse)	1.50
/// » » <i>Jankæ</i>	1.50
± /// » » <i>lanuginosus</i> (<i>pannonicus</i>)	0.75
± // /// » » <i>serpyllum</i> , <i>Serpolet</i>	0.50
» » » à fl. blanches	0.50
» » » à fl. carmin vif	0.75
Bo R S » » <i>vulgaris</i>	0.50
± /// » » <i>Zygis</i>	0.75

Bonnes pl. mellifères p. soleil, pleine terre ou roc, longue floraison.

O // <i>Tiarella cordifolia</i>	0.75
O » » <i>poliphylla</i>	0.50
O » » <i>purpurea</i>	0.75
H T <i>Tofieldia borealis</i>	1.50
H T » » <i>calyculata</i>	0.75
/// <i>Towsendia Wilcoxiana</i>	2.50
R S <i>Trachelium cœruleum</i>	0.75

	Fr. Cts
~ <i>Tradescantia navicularis</i>	2.50
V » » <i>virginica</i>	0.75
» » » à fl. blanches	0.75
Pa <i>Tricyrtis hirta</i>	1.—
× O <i>Trientalis europæa</i>	1.50
R <i>Trifolium alpinum</i>	2.50
R » » <i>uniflorum</i>	2.50
R <i>Triteya uniflora</i>	0.50
R » » <i>violacea</i>	0.50
<i>Trollius asiaticus</i>	1.—
» » <i>aurantiacus</i>	1.50
» » <i>europæus</i> , <i>Globeflower</i> (la douzaine 6 fr.)	0.75
» » <i>hybridus</i>	1.50
» » <i>pumilus</i>	1.—
» » <i>yunnanensis</i>	1.50

Les Trolles sont de gros boutons d'or aux fl. globuleuses et odorantes, qui recherchent les sols frais et humides mais ensoleillés. Mai-juin.

<i>Tulipa aximensis</i>	1.—
» » <i>Billietiana</i>	0.50
» » <i>Celsiana</i>	0.50
» » <i>Clusiana</i>	0.50
» » <i>Didieri</i>	0.50
» » <i>Gallica</i>	0.50
» » <i>Marjoletti</i>	1.—
» » <i>præcox</i>	0.50
» » <i>saxatilis</i>	0.50
» » <i>sylvestris</i>	0.50
± /// <i>Tunica saxifraga</i>	0.75
» » » <i>alba</i>	0.75
» » » fl. pl.	1.50
Aq <i>Typha angustifolia</i>	1.—
Aq » » <i>latifolia</i>	1.—
R /// <i>Umbilicus pendulinus</i>	1.—
R » » <i>Semenowi</i>	1.50
Voir en outre <i>Cotyledon</i> .	
H <i>Uniola latifolia</i>	1.—
Curieuse graminée américaine à épillets plats d'un bel effet décoratif.	
// R <i>Uvularia grandiflora</i>	1.—
R <i>Vaccinium corymbosum</i>	5.—
R Pa Sp » » <i>macrocarpum</i>	2.50
R O // » » <i>Myrtillus</i> , <i>Myrtile</i>	2.50
Sp » » <i>oxycoccus</i>	2.50
R × » » <i>uliginosum</i>	2.50
R × » » <i>Vitis Idæa</i> , <i>Airelle</i>	2.50
R × » » <i>pennsylvanicum</i>	5.—
V <i>Valeriana Alliariæfolia</i>	1.—
Pa » » <i>dioica</i>	0.75
/// R » » <i>globulariæfolia</i>	2.50
R » » <i>integrifolia</i>	1.50
R /// » » <i>longiflora</i> (pl. rare et belle)	2.50
R » » <i>montana</i>	0.75
Med // » » <i>officinalis</i>	0.75
// R O » » <i>pyrenaica</i>	1.—
/// » » <i>Saliunca</i>	2.50
/// » » <i>saxatilis</i>	2.50
/// » » <i>supina</i>	2.50
R /// » » <i>tripteris</i>	0.75
R S » » <i>tuberosa</i>	1.—

Les Valérianes sont bien connues pour les propr. odorantes de leurs racines; fl. blanc-rosé, persistant longtemps; mi-soleil et fraîcheur.

Fr. Cts

Aq	Vallisneria spiralis.	1.—
O	Vancouveria hexandra.	2.50
///	Vella pseudocytisus.	2.50
/// R	» spinosa.	2.50
R V	Veratrum album.	2.50
R V	» nigrum.	2.50
V	Verbascum Olympicum.	0.75
R	» Phœnicæum.	0.75
± R	Verbena radicans.	1.—
± Bo	» venosa.	0.75
V	Verbesina virginica.	1.—
V	Vernonia glauca.	1.—
V	» præalta.	1.—

Grandes Composées d'automne à fl. carmin ou pourpre
(octobre-novembre).

VÉRONIQUES

I. ESPÈCES ALPINES, NAINES OU SAXATILES :

± R ///	Veronica Allionii.	1.50
R O	» alpina.	1.—
R O	» aphylla.	0.75
R ///	» armena.	0.75
+	» austriaca.	0.75
R	» bellidifolia.	0.75
R	» Biebersteiniana.	0.75
R	» Biebersteinii v. tenuifolia.	0.75
R ///	» bombycina.	2.50
///	» cæspitosa.	2.50
R	» carnea.	1.—
± ~///	» canescens (minus espèce).	2.50
± R	» caucasica.	0.75
± R	» cinerea.	2.50
± Pr	» Chamaedrys.	0.50
R	» filiformis (la douz. 5 fr.).	0.50
R ///	» fruticulosa.	0.75
R	» incana.	0.75
R	» Kellereri.	0.50
R	» Kotschyi.	2.50
± T ///	» melissæfolia.	0.75
O ///	» montana.	0.75
±	» officinalis.	0.75
/// R	» orientalis.	0.75
R	» peduncularis.	0.75
±	» Pœnæ.	0.75
R+ Bo	» prostrata (bleu intense).	0.75
± R	» rupestris.	0.75
R	» » alba.	1.50
R ///	» saturejoides.	0.75
R ///	» saratilis.	0.75
	» » à fl. blanches.	1.50
± H	» serpyllifolia.	0.75
R	» spicata.	0.75
S	» » à fl. blanches.	1.—
	» » à fl. roses.	1.50
R ///	» surculosa.	0.50
R	» teliphiifolia.	1.—
R	» tenuifolia.	1.50
Pr R	» Teucrium.	1.50
R	» Trahernæ.	1.—
O ///	» urticifolia (latifolia).	0.75
R	» Whitalli.	1.—

II. ESPÈCES EN TOUFFES ÉRIGÉES, PLUS
OU MOINS ÉLEVÉES :

Fr. Cts

Veronica	crassifolia.	1.—
»	crassifolia alba.	1.50
»	Gentianoides.	0.75
»	» var. steno-	
	phylla.	0.75
»	» fol. var.	0.75
»	longifolia.	0.75
»	maritima (paniculata).	0.75
»	» alba.	0.75
»	» rosea.	1.—
»	subsessilifolia.	1.50

Pl. de plates-bandes ou de rochers, à fl. bleues ou roses, en épis dressés, très recherchées des abeilles, florifères (juillet-octobre) et excellentes pour les bouquets.

R ///	Vesicaria utriculata.	0.50
R	Vicia Montenegrina.	1.—
R Pr	» Orobus.	2.50
R	» pyrenaica.	1.50
R	» unijuga.	2.50
Aq	Villarsia nymphoides.	0.75
R	Vinca acutiflora (mædia).	0.75
R Bo	» herbacea (la douz. 5 fr.).	0.50
R	» difformis.	1.50
R	» Libanotica.	2.50
Bo	» major (la d. 2 fr.).	0.50
	» » à f. panachées.	0.75
	» » à f. réticulées.	0.75
	» » à f. marginées.	0.75
Bo	» minor (petite pervenche) la	
	douzaine 2 fr.	0.50
	» » à feuil. panachées.	0.50
	» » à fl. doubles.	0.50

VIOLA

I. ESPÈCES DU GENRE VIOLETTE :

R	Viola arenaria.	1.—
R /// O	» biflora.	0.75
R n	» canadensis.	1.—
/// R	» canina.	0.75
	» » à fl. roses.	1.50
R	» cucullata.	0.75
	» » à fl. blanches.	0.75
	» » var. grandiflora.	1.—
R	» cyanea.	0.75
R	» declivis (rare et parfumée).	0.50
R	» dissecta.	1.—
H	» elatior.	0.50
R	» Jooi.	1.50
R	» Labradorica.	1.—
	» mirabilis.	0.75
R	» odorata (violette).	0.50
	» » var. à fl. rouges.	0.75
Sp T	» palustris.	2.50
R Pr	» pratensis.	0.50
	» pedata.	2.50
R S	» pinnata.	1.—
R	» primulifolia.	1.50
R	» purpurea fl. rouges.	2.50
/// R	» Riviniana.	1.—
R	» rubra.	0.75

	Fr. Cts
Pr <i>Viola stricta</i>	0.50
R » <i>sulfurea</i>	0.75
Violettes odorantes en 20 variétés avec noms.	0.75
Violettes doubles, de Parme, lilas violet sombre ou blanc pur	0.75
Violettes à fl. doubles : Bruneau- tiana, la vieille violette, violet très foncé à fl. très pleines ; Napolitaine, à fl. pleines d'un bleu de lavan- de ; blanc pur à fl. pleines	1.—

II. ESPÈCES DU GROUPE PENSÉES :

M R <i>Viola alpina</i>	2.50
R » <i>altaica</i>	1.—
R » <i>Bosniaca</i>	1.—
/// M » <i>Beckiana</i>	2.50
R /// » <i>Bertoloni</i>	1.50
± R » <i>calcarata</i> , Pensée des Alpes	1.—
M /// » <i>cenisia</i>	2.50
R » <i>cornuta</i> (la douz. 5 fr.)	0.50
» à fl. blanches »	0.50
» <i>cornuta</i> Perfection	0.50
» » <i>rosea</i>	1.50
» » <i>Wernig</i>	0.75

Nous offrons en outre, à 50 cent. pièce, la collection complète de *Viola cornuta* variées (Pensées vivaces) dont les noms ont été publiés dans notre liste des graines.

/// <i>Viola declinata</i>	2.50
R /// » <i>Eugeniæ</i>	2.50
R » <i>Florariensis</i> (3 fr. la douz.)	0.50

Variété très florifère, hybride des *V. cornuta* et *Rothomagensis*, qui se couvre d'un bout de l'année

à l'autre, de fl. lilas très voisines de la pensée des Alpes. Dans un lieu abrité de Flore elle n'a pas cessé de fleurir du 1^{er} janvier au 31 décembre. C'est l'une des meilleures pl. de jardins et rochers et des plus faciles à cultiver.

R <i>Viola gracilis</i>	1.50
/// » <i>heterophylla</i>	1.50
R » <i>latisepala</i>	1.50
R » <i>lutea</i> (la douz. 5 fr.). L'une des plus brillantes ; fleurit toute l'année.	0.50
Bo R » <i>Mumbyana</i>	0.50
/// M » <i>nummulariæfolia</i> , la mer- veilleuse pensée bleu azur des Alpes-Maritimes et Corse	2.50
R n » <i>pubescens</i>	1.50
R » <i>pseudo-gracilis</i>	1.50
R /// » <i>rothomagensis</i> , fleurit tout l'hiver.	0.75
R » <i>splendida</i>	0.75
» » <i>hybrida</i>	0.75
R » <i>Sudetica</i>	1.50
R » <i>Zoyzii</i>	1.50
/// R » <i>Valderia</i>	2.50
/// R <i>Vittadenia triloba</i> (<i>Erigeron</i> <i>mucronatus</i>) l'une des meilleures pl. de mur. et rochers : soleil	0.50
Wahlenbergia, [v. <i>Hedraeanthus</i>	
R <i>Waldsteinia geoides</i>	1.50
/// O <i>Wulfenia Carinthiaca</i>	1.—
R V <i>Yucca angustifolia</i>	2.50
» <i>gloriosa</i>	1.50
» <i>pendula</i>	1.50
R S <i>Zauschneria californica</i>	1.—
R <i>Zwackia aurea</i> , Bourrache jaune	1.50



Mur fleuri

Orchidées rustiques

Nous adoptons dans cette liste la nomenclature suivie dans le volume » Album des orchidées d'Europe », par H. CORREVON ; ce livre, qui traite de toutes les Orchidées pouvant résister dehors sous notre climat, est en vente au Jardin alpin au prix de 25 fr. Il est illustré de 66 planches coloriées et contient la desc et le mode de culture de toutes les espèces terrestres rustiques.

	Fr. Cts		Fr. Cts
<i>Aceras anthropophora</i> (<i>Orchis Homme pendu</i>)	1.50	<i>Orchis maculata</i> (<i>Orchis maculé</i>)	1.—
» <i>longibracteata</i>	2.50	» » à fl. blanches	2.50
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (<i>O. pyramidal</i>)	1.—	» <i>mascula</i> (<i>Orchis mâle</i>)	1.—
<i>Bletilla hyacinthina</i> (<i>Jacinthe du Japon</i>)	1.50	» <i>militaris</i> (<i>Orchis militaire</i>)	1.—
<i>Cœloglossum viride</i> (<i>Orchis grenouille</i>)	1.50	» <i>morio</i> (<i>Orchis bouffon</i>)	1.—
<i>Cypripedium Calceolus</i> (<i>Sabot de Vénus</i>)	1.—	» » à fl. blanches	2.50
La douzaine	10.—	» » à fl. roses	2.50
» <i>spectabile</i> (<i>Cypripède superbe</i>)	2.50	» » à fl. violet-noir	2.50
<i>Epipactis palustris</i> (<i>E. des marais</i>)	1.50	» » à fl. lilas pâle	2.50
<i>Goodyera repens</i> (<i>Godière rampante</i>)	2.50	» <i>palustris</i> (<i>Orchis des marais</i>)	1.—
<i>Gymnadenia albida</i> (<i>Orchis miel</i>)	1.50	» <i>pallens</i>	1.50
» <i>conopea</i> (<i>Orchis parfumé</i>)	1.—	» <i>papilionacea</i>	2.50
» <i>candidissima</i> (blanc pur)	2.50	» <i>provincialis</i>	2.50
» <i>odoratissima</i> (<i>Orchis suave</i>)	1.50	» <i>pyramidalis</i> , voir <i>Anacamptis</i>	
<i>Herminium Monorchis</i>	1.50	» <i>sambucina</i> (<i>Orchis sureau</i>)	1.—
<i>Himantoglossum hircinum</i> (<i>O. Bouc</i>)	1.50	» » à fl. rouges	1.—
<i>Liparis Læselii</i>	2.50	» <i>Simia</i> (<i>Orchis singe</i>)	1.—
<i>Listera cordata</i>	2.50	» <i>Spizelii</i>	2.50
» <i>ovata</i> (<i>Listère à f. ovales</i>)	1.—	» <i>tridentata</i>	2.50
<i>Nigritella angustifolia</i> (<i>Orchis vanillé</i>)	1.—	» <i>ustulata</i> (<i>Orchis brûlé</i>)	1.50
<i>Ophrys apifera</i> (<i>Ophrys abeille</i>)	1.50	<i>Planthantha bifolia</i> (<i>Orchis à deux feuil.</i>)	1.50
» <i>arachnites</i> (<i>Ophrys frelon</i>)	1.50	» <i>chlortha</i> (<i>Orchis verdâtre</i>)	1.—
» <i>aranifera</i> (<i>Ophrys araignée</i>)	1.50	<i>Serapias cordigera</i>	1.50
» <i>atrata</i>	1.50	» <i>lingua</i>	1.50
» <i>fusca</i>	1.50	» <i>longipetala</i>	1.50
» <i>lutea</i>	1.50	» <i>neglecta</i>	2.50
» <i>Bertoloni</i>	1.50	<i>Spiranthes aëtivalis</i> (<i>Spiranthe</i>)	1.50
» <i>bombiliflora</i>	2.50	» <i>autumnalis</i>	1.50
» <i>muscifera</i> (<i>Ophrys mouche</i>)	1.—		
» <i>nicaense</i>	2.50		
» <i>speculum</i>	2.50		
» <i>scolopax</i>	2.50		
<i>Orchis Champagneuxi</i>	2.50		
» <i>coriophora</i> (<i>Orchis punaise</i>)	2.50		
» <i>foliosa</i>	2.50		
» <i>fragrans</i>	2.50		
» <i>fusca</i> (<i>Orchis brun</i>)	2.50		
» <i>galeata</i> (<i>Orchis casque</i>)	1.50		
» <i>giobosa</i> (<i>Orchis globuleux</i>)	1.50		
» <i>incarnata</i> (<i>Orchis incarnat</i>)	1.—		
» <i>latifolia</i> (<i>Orchis à f. larges</i>)	1.—		
» <i>lactea</i>	2.50		
» <i>laxiflora</i>	2.50		

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

Nous faisons des collections d'orchidées rustiques, composées d'après les conditions de culture qui nous sont indiquées, et de telle façon qu'elles réussissent dans ces conditions, aux prix de :

50	Orchidées de plein air, en 25 esp.	35.—
25	» en 25 espèces	20.—
25	» en 10 »	12.—
12	» en 12 »	10.—
12	» en 6 »	5.—

Fougères rustiques

	Fr. Cts		Fr. Cts
* Adiantum capillus Veneris (<i>Cheveux de Vénus</i>)	1.—	Nephrodium Goldianum	2.50
» pedatum	1.50	» montanum (<i>Oreopteris</i>)	2.50
Allosorus, voir <i>Cryptogamme</i> .		» rigidum (<i>Aspid. rigidum</i>)	2.50
Aspidium aculeatum	1.—	» spinulosum	1.50
» angulare	2.50	» thelypteris	1.50
» » proliferum	2.50	~ Notocleana Maranthæ	1.50
» laserpitiifolium	3.50	» Vellæ	2.50
» setosum	2.50	~ Onychium japonicum	2.50
» lobatum (beau et très solide)	1.—	Onoclea germanica (<i>Struthiopteris germ.</i>)	0.50
» Lonchitis (<i>Holyfern</i>)	1.50	» orientalis (<i>Struthiopt. pensylvanica</i>)	2.50
Asplenium adiantum-nigrum	1.—	» sensibilis	1.—
» angustifolium	2.50	Esp. traçantes, très propres à garnir rapidement les lieux ombragés.	
» Ceterach (<i>Ceterach officinarum</i>)	0.75	Ophioglossum lusitanicum	2.50
» Filix-fœmina (<i>Foug. fem.</i>)	0.75	» » vulgatum	1.50
Nous offrons les variétés suivantes du f. f. : cristatum, Edwardsii, Elworthii, Frizellæ, Howardi plumosum et Victoriæ, au prix de 2 fr. 50.		Osmunda cinnamomea	2.50
Asplenium fissum (la plus fine des fougères)	2.50	» Claytoniana (<i>O. interrupta</i>)	2.50
» fontanum (Halleri)	0.75	» gracilis	2.50
» germanicum	2.50	» regalis (<i>F. royale</i> ; <i>F. fl.</i>)	1.50
» Goringianum pictum	2.50	» » cristata	2.50
» lepidum	10.—	Polypodium Dryopteris (<i>Oak fern</i>)	1.50
» marinum	2.50	» Phæopteris (<i>Beach fern</i>)	1.50
» Petrarchæ (glandulosum)	2.50	» Robertianum (<i>P. calcareum</i>)	1.50
» rutamuraria (<i>Rue des murs</i>)	0.50	» vulgare (<i>Fougerolle, Réglisse des bois</i>)	1.—
» Seelosi	5.—	» vulgare, var. <i>cambricum</i>	2.50
» septentrionale	1.50	Polystichum, voir <i>Aspidium</i> .	
» trichomanes	0.50	Pteris aquilina (<i>Fougère impériale</i>)	2.50
» viride	1.—	» cretica	2.50
Athyrium, voir <i>Asplenium</i> f. f.		Scolopendrium Hemionitis	10.—
Botrychium Lunaria, <i>Lunaire</i>	2.50	» vulgare (<i>Langue de cerf</i>)	0.75
Ceterach, voir <i>Asplenium</i> .		Scolop. vulgare crispum	2.50
Cheilanthes fragrans, <i>Ch. odora</i>	2.50	» vulgare dædaleum	2.50
Cryptogamme crispa, <i>Allosorus crispus</i>	2.50	» » laceratum	2.50
Cyrtomium atratum	2.50	» » undulatum	2.50
» falcatum	1.50	Selaginella denticulata	1.50
» Fortunei	1.50	» Helvetica	1.50
» lucidum	2.50	» Wildenowii, mousse sousarborescente rustique	2.50
Cystopteris alpina	1.50	Woodsia hyperborea	2.50
» bulbifera (<i>Foug. bulbifère</i>)	1.—	» ilvensis	2.50
» fragilis (l'une des pl. graci.)	1.—	» obtusa	2.50
» montana	2.50		
Lastrea, voir <i>Nephrodium</i> .			
Nephrodium (<i>Lastrea</i>) cristatum	2.50		
» decursive-pinnatum	2.50		
» dilatatum	1.—		
» filixmas (<i>Fougère male</i>)	1.—		
» » var. crispum	2.50		
» » var. cristatum	2.50		
» » var. grandiceps	2.50		
» » var. grandidens	2.50		
» » var. Pinderi	2.50		

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

50 Foug. en 50 esp. ou variétés	50.—
50 » en 25 »	35.—
25 » en 25 »	25.—
25 » en 10 »	15.—
12 » en 12 »	15.—
12 » en 6 »	10.—

Cactées rustiques

	Fr. Cts
Mammillaria pusilla.	2.50
Opuntia arborescens.	2.50
» albospina	2.50
» Arkansæ.	1.50
» camanchica	2.50
» » carnea stra-	
» » minea	2.50
» » carnosa.	2.50
» » var. gigantea	2.50
» » var. rubra (fl.	
» » rouge vif).	5.—
» cantabrigensis	2.50
» flavispinna.	2.50
» macrorhiza.	2.50
» mesacantha	2.50
» missouriensis	2.50
» orbicularis	2.50

	Fr. Cts
Opuntia pisciformis	2.50
» polycantha.	2.50
» Raffinesquiana	1.—
» rodantha (rose carmin vif)	5.—
» rubra (fl. rouge)	2.50
» salmonea	2.50
» spinocentra	2.50
» vulgaris (Cactus du Tyrol)	1.—
» Xantostemma	2.50

Ces Cactées sont d'une grande beauté. Elles résistent à nos climats les plus rudes, même au Nord de l'Allemagne, si l'on a soin, l'hiver, de les couvrir d'un toit en planches à une certaine hauteur, de manière à ce que l'air puisse jouer dessus sans que la pluie ou la neige les atteigne. — Chez nous il suffit de les planter en plein soleil et dans un lieu sec ; il est inutile de les couvrir l'hiver.

Arbustes, arbuscules pour les rocailles et arbres divers

	Fr. Cts
Abelia chinensis (rupestris).	2.50
» triflora, très odorant	2.50
» Græbneriana.	5.—
» lobata	5.—
» serrata	5.—
Acer palmatum atropurpureum.	2.50
Akebia lobata	2.50
» quinata	2.50
Amelanchier canadensis	1.50
» vulgaris	1.50
Ampelopsis Engelmanni	1.50
» muralis	1.50
» quinquæfolia (vigne-vierge)	0.50
» Veitchii	1.50
Amygdalus nana, délicieux arbust.	
aux fl. rose vif.	1.—
Aralia spinosa	1.50
Arbutus Unedo (Arbousier)	2.50
Atriplex Halimus, Pourpier de	
mer.	1.50
Arauja albens.	1.50
Aristolochia Sypho	2.50
Aucuba variés	1.50
Berberis : Alkusiensis, anguilisans	
brachypoda, carminea, cor-	
ral, Coryi, candidulus, Da-	

	Fr. Cts
rwini, dictyophilla, dia-	
phana, Farreri, ferox, Ga-	
gnepainii, ilicifolia, Ju-	
liæ, lævis, polyantha,	
Prattii, sanguinea, Spar-	
kleyi, stenophilla, sub-	
cauliolata, Thunbergi, ver-	
ruculosa, virescens, Wil-	
sonniana à.	2.50
Berchemia racemosa.	2.50
Betula medwedeffi	2.50
Betula nana	1.50 à 2.50
» pendula	2.50 à 5.—
» purpurea	2.50 à 5.—
» pumila	2.50
Bignonia capreolata.	2.50
» grandiflora (plus. variétés)	2.50
» radicans.	1.50
Budleya variabilis.	1.— à 2.50
» var. magnifica et superba.	2.50
» var. Veitchiana.	2.50

Arbustes de grande valeur décorative et longue floraison ; ombre ou soleil.

Bupleurum fruticosum.	2.50
Buxus balearica.	1.50
» rotundifolia	1.50

	Fr. Cts		Fr. Cts
Buxus sempervirens. . . 1.— à	2.50	Cotoneaster Franchetti	2.50
Calycanthus floridus (arbre aux		» frigida.	2.50
anémones).	2.50	» humifusa	2.50
» occidentalis	2.50	» pannosa	2.50
» praecox (Bois fleuri 2.50 à	5.—	» moupinensis	2.50
Calycotome spinosa (Tue-chèvre)	2.50	» rotundifolia	2.50
Ceanothus americanus	2.50	» rugosa.	2.50
» « Gloire de Versailles » . .	2.50	» thymifolia.	2.50
Cedrus Libani 5.— à	15.—	» tomentosa.	2.50
§ Celastrus scandens (Liane du		» vulgaris	2.50
Caucase).	2.50	» Wheeleri.	2.50
Cerisiers du Japon à fl. doubles		Crataegus (Aubépine) à fl. roses	
dans les var. à fl. roses,		» doubles	2.50
blanches, carmin ou jau-		» à fl. rouge foncé, doubles .	2.50
nâtre 3.— à	10.—	Cupressus glabra (Cyprés glabre	
Cerisiers à fruits jaunes	5.—	de l'Arizona). Superbe et	
Cercis siliquastrum (Arbre de		des plus rustiques chez	
Judée). 2.50 à	5.—	nous ; va jusqu'à près de	
Chamæcerasus, v. Lonicera.		1.000 m. d'alt. et constitue	
Chamæcyparis lycopodioides (Sé-		l'un des plus beaux orne-	
laginelle en arbre)	2.50	ments des jardins; pyramide	
Chenomeles alpina et Japonica.		grisâtre fournie à verdure	
Types sauvages du coi-		fine et gros cônes 5.— à	15.—
gnassier de Japon 2.50 à	5.—	» sempervirens (Cyprés d'Ita-	
Chionanthus virginica	2.50	lie pyramidal), l'arbre	
Citrus trifoliata (Citronier du		cher à Boecklin et le plus	
Japon) 2.50 à	5.—	beau des conifères ; rusti-	
Cistus v. chap. I.		que en Suisse romande, en	
Clematis Armandi.	2.50	plein soleil. . . 5.— à	15.—
» coccinea.	2.50	Cytisus albus (Genêt blanc) . .	2.50
» flammula Nuage fleuri, clé-		» austriacus	2.50
matite odorante	1.50	» capitatus	2.50
» graveolens, à fl. jaunes. .	1.50	» hirsutus	2.50
» montana Cl. de l'Himalaya	2.50	» Laburnum (Pluie d'or) 2.50 à	5.—
» » à fl. rose clair. .	2.50	» nigricans	2.50
» » à fl. rose foncé .	2.50	» radiatus.	2.50
» paniculata du Japon . . .	2.50	» sessilifolius.	2.50
» Tangutica, fl. jaune vif. .	2.50	» triflorus	2.50
» Vitalba (Vouable, Vigne		» Weldeni.	2.50
fleurie)	1.—	Decaisnea Fargesii.	5.—
» viticella	1.50	Desmodium penduliflorum . . .	2.50
Clerodendron foetidum	2.50	Deutzia en nombr. var. bl. et ros.	2.50
Cognassier ou Poirier de Japon.		Elæagnus argenteus	5.—
Nous possédons la collec-		Exochorda Alberti.	2.50
tion dans les var. à fl.		» grandiflora.	2.50
bl., rouges, rouge vif, car-		Edgeworthia chrysantha (Daphne	
dinal, ponceau, sanguin .	2.50	jaune). 2.50 à	5.—
Colletia chilensis	5.—	Euonymus latifolius (du Tessin)	2.50
Coronilla Emerus	2.50	» microphyllus.	2.50
Corylus purpureus.	2.50	» radicans.	2.50
Cotoneaster acuminata.	2.50	» » fol. var.	2.50
» adpressa.	2.50	Forsythia Fortunei	2.50
» applanata	2.50	» suspensa.	2.50
» angustifolia (Pyracantha)..	1.50	» viridissima.	2.50
» bullata	2.50	Fuschsia gracilis, rustique . .	1.50
» buxifolia.	2.50	Ginckgo biloba (jeunes) . . .	2.50
» congesta, très tapissant . .	2.50	Glycine voir Wisteria.	
» Davidiana (horiz.) 1.50 à	5.—	Genista alba	1.50
» depressa.	2.50	» Andreana et var. . 1.50 à	5.—
» Delsiana.	2.50	» anglica	2.50
» divaricata	2.50	» anxantina	1.50
» faveolata	2.50	» candicans (monspessulanus)	2.50
» Farreri	2.50	» cinerea	1.50

	Fr. Cts
Genista Dallimoreana, rose carminé.	2.50
» Germanica.	2.50
» hispanica	2.50
» horrida	2.50
» januensis	2.50
» juncea, le superbe Genêt d'or	1.50
» pilosa (trainant et très florifère).	1.50
» præcox	2.50
» prostrata (Halleriou decumbens).	2.50
» radiata	1.50 à 2.50
» Scoparia (Sarthothamnus Scop).	1.50 à 2.50
» scorpius	2.50
» tinctoria et tinctoria, fl. pl.	1.50 à 2.50
» triquetra (genêt corse)	2.50
» Villarsii (Genêt pygmée).	2.50
Halimodendron argenteum.	2.50
Hedysarum multijugum	2.50
Hamamelis virginica.	2.50
Hibiscus Syriacus en 25 var. div.	2.50

C'est la Mauve en arbre qui fleurit jusqu'en automne.

Hydrangea paniculata	2.50
» quercifolia (rareté)	4.—
» scandens (Hortensia grim-pant)	2.50
Hypericum aureum	2.50
» densiflorum	2.50
» Hookerianum.	2.50
» Henryi	2.50
» patulum (Rose de Saron).	2.50
» galioides	2.50
» Kalmianum	2.50
» Lysimachioides.	2.50

If, (voir Taxus).

Indigofera dosua 1.50

Illicium anisatum, l'arbre sacré du Japon 5 à 10.—

§ Jasminum affine, belle var. du jasmin bl. à gdes fl. et plus vigoureuse. 2.50

» Beesianum. 1.—

» fruticans. 2.50

» humile. 1.50

» nudiflorum, fleurit l'hiver 1.50

» officinale (jasmin grim-pant) 1.—

» primulinum (grandes fl. j.) 2.50

» revolutum. 2.50

Juniperus] nana. 2.50

» Sabina. 2.50

Kerrya japonica à fl. simples 1.50

» japonica à fl. doubles. 1.—

» » à feuil. panachées 2.50

Lagerstrœmia indica 2.50

Laurus nobilis (Laurier d'Apollon) 2.50

Leycesteria formosa 2.50

Ligustrum chinense 1.50 à 5.—

Lilas voir Syringa.

	Fr. Cts
§ Lonicera brachypoda aureo reti-culata.	2.50
§ » Caprifolia (Chèvrefeuille)	1.50
» japonica, très odorant.	1.50
» chinensis, fleurit longtemps	1.50
» fuchsioïdes, rouge vif	2.50
» Henryi	2.50
» implexa	2.50
» Peryclimenum	2.50
» etrusca	2.50
» sempervirens.	2.50
Lonicera du groupe arbustes dressés Chamæcerasus	
» Alberti, suavissime	2.50
» alpigena, pour ombre.	2.50
» cœrulea, rocaïlle ombragée.	2.50
» nitida, l'un des plus géné-reux arb. des rochers.	
» pileata.	1.50
» pyrenaica, délicieux arbre de rocaïlle.	2.50
» Tibetica.	2.50
§ Lycium barbarum.	1.—
Mahonia aquifolia, pour ombre	2.50
Marsdenia erecta	2.50
Malus, pommiers d'ornement aux fl. pl. ou simples, diverse-ment colorées.	2.50 à 10.—
§ Menispermum scandens	2.50
Myrica gale.	2.50
Myrtus parvifolius	2.50
Nandina domestica	2.50
Nuttalia cerasiformis, fl. précoces	2.50
§ Passiflora cœrulea.	2.50
Peltaria ramentacea.	2.50
Periploca (græca)	2.50
Persica (pêchers) à fleurs doubles, rose tendre	2.50 à 5.—
Phelodendron japonica, recherché des abeilles	5.—
Philadelphus divers à fl. simples ou doubles.	2.50
Pinus Armandi	2.50
» Cembro (Arolle).	2.50 à 5.—
» montana.	5.—
» Pinea (Pin parasol)	5.— à 15.—
Pistachia (Pistachier)	5.—
Phyllirea latifolia	2.50
§ Polygonum Auberti	2.50
» Baldschuanicum	2.50
§ Populus trychocarpa (Peuplier odorant).	2.50 à 5.—
Prunus à fl. pleines.	5.—
Punica granatum (grenadier)	5.—
Pyracantha angustifolia	1.50
Rhamnus fallax.	2.50
» pumila	2.50
» saxatilis.	2.50
Rhodotypus Kerrioides	2.50
Rhus Cotinus (arbre à perruque).	1.50
» atropurpureus	2.50
Ribes aureum (Groseille dorée)	1.50
» atrosanguineum.	2.50

	Fr. Cts		Fr. Cts
<i>Ribes sanguineum</i> (cassis à fl. ros.)	1.50	<i>Spiræa hypericifolia</i>	1.50
<i>Robinia hispida</i>	2.50 à 5.—	» <i>Lindleyana</i>	1.50
<i>Rosa alpina</i> . Eglantine sans épin.	1.50	» <i>Thunbergi</i> , fl. délic. et fines	1.50
» <i>berberidifolia</i> , du Turkestan	5.—	<i>Staphylea colchica</i>	2.50
» <i>Banksia</i> , fl. jaunes doubles	2.50	<i>Syringa</i> (lilas). Nous en possédons	
» <i>canina</i> (Eglantine)	1.—	toute une collect. greffés	
» <i>centifolia</i> type ancien.	1.50	sur racines à	2.50
» » <i>muscosa</i> (Rose		<i>Tamarix aestivalis</i> (fleurit l'été)	2.50
mousse)	2.50	» <i>caspica</i>	2.50
» <i>Eglanteria</i> (Rose capucine)	2.50	» <i>Hohenackeri</i> , à fl. blanches	2.50
» <i>Fortuneana</i> (Eglantine de		» <i>plumosa</i>	2.50
Japon)	2.50	» <i>Kaschgarica</i> , le plus beau de	
» de Fortune ou Eglantine de		tous.	5.—
Nice	2.50 à 5.—	<i>Taxus hibernica</i> (if)	5.—
» <i>lutea</i> , Eglantine jaune souf.	2.50	» <i>pyramidalis</i>	5 à 10.—
» <i>nana</i> (Lawrenciana).	2.50	<i>Ulex europæus</i> (ajonc).	2.50
» <i>mutabilis</i> , de l'Isolabella	5.—	» » à fl. doubles.	2.50
» <i>pimpinellifolia</i>	2.50	<i>Viburnum Carlesi</i> , à fl. suaves	5.—
» » vars Scotch br.	2.50	» <i>macrocephalum</i>	2.50
» <i>rubrifolia</i> (ferruginea).	2.50	» <i>Opulus nanus</i>	2.50
» Bouletti le plus nain de tous		» <i>Opulus fl. pl.</i> (Boules de nei-	
les rosiers, introduit par		ge)	1.50
nous en 1920	2.50	<i>Tinus</i> (Laurier tin)	2.50
» <i>Watsonniana</i>	2.50	» <i>plicatum</i>	2.50
<i>Rubus laciniatus</i> (fruit délic.)	1.50	<i>Vitex Agnus castus</i> (Gattilier)	2.50
» <i>odoratus</i>	1.50	<i>Veronica buxifolia</i> , <i>carnosula</i> ,	
<i>Ruscus aculeatus</i> (Fragon, buis		<i>Chatamica</i> , <i>pinguæfolia</i> ,	
ardent) excellent pour sous-		<i>Traversi</i>	2.50
bois, lieux ombragés, etc.	1.50	§ <i>Vitis Coignetia</i>	2.50
» <i>hypoglossum</i>	2.50	§ <i>Wystaria</i> (Glycine) <i>multijuga</i> (Gl.	
» <i>racemosus</i>	2.50	du Japon).	2.50
<i>Smilax aspera</i> (Salsepareille du		» <i>sinensis</i>	2.50
Midi)	2.50	» » <i>alba</i>	2.50
» <i>excelsa</i> (Salsep. du Caucase)	2.50	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	2.50
» <i>mauritanica</i> (Salsep. du		<i>Zanthoxylum spinosum</i>	2.50
Nord africain)	5.—	<i>Zelkova sinica</i>	2.50
» <i>pseudo-China</i> (Salsep. de		<i>Saule pleureur</i> de Napoléon. Bou-	
Chine).	2.50	tures prises sur le tombeau	
<i>Spiræa argentea</i>	1.50	de Napoléon I ^{er} à Ste-	
» <i>bullata</i>	1.50	Hélène	5.— à 10.—

OMISSIONS

<i>Ajuga orientalis</i>		<i>Rubus bambusæformis</i>	2.50
<i>Caulophyllum Thalictroides</i>	2.50	<i>Saxifraga infundibuliformis</i>	2.50
<i>Grenovia aurea</i>	2.50	<i>Sedum</i> (<i>Monanthes</i>) <i>Jaccardi</i>	2.50
<i>Osmanthus Delavayi</i>	2.50	<i>Sutherlandia frutescens</i>	2.50

OUVRAGES RECOMMANDÉS

GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile. Fr. suisses 5.—
Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs). Bruxelles 1924.

Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume brochéFr. suisses 15.—

Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'*Orphys*, de *Serapias* appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume brochéFr. suisses 25.—

Alpeplanter og Deres Dyrkning. Dansk Udgave 1924 af « Plantes des Montagnes et des Rochers ». Ravideret, tilpasset efter danske Forhold og fort a jour. Med 76 smukke Illustrationer efter Fotografier af Reginald A. Malby og andre Kr. 9.50
(Host et Sons, Copenhagen).

OUVRAGES DE M. LE PROF. A. BUYSENS

Floriculture. 340 figures. Traité complet de floriculture de plein air et de serres Fr. français 25.—

Le Petit Jardin fleuri. 136 figures. Manuel de floriculture de plein air à l'usage des amateurs de fleurs. Fr. français 8.—

La Maison fleurie. 84 figures. Manuel de floriculture à l'usage des amateurs de fleurs et plantes d'appartements. Fr. français 6.—

En dépôt à « Floraire »

Liste des Ouvrages de M. Henry Correvon

en vente à Floraire

Les Plantes des Alpes, Genève, 1885	Epuisé
Les Fougères rustiques, Genève, 1890.	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893.	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions.	»
Flora tascabile, 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocaïlles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public)	Epuisé
Culture de plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2 ^e édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 25.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 vol. avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques exemplaires à	» 75.—
Par monts et par vaux (courses de montagnes).	Epuisé
Nos arbres, un volume in-8 ^o , richement illustré	»
La flore alpine, un volume richement illustré (2 ^e édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The alpina flora, translated into English by Mr. E.-W. Clayforth; a superbe volume with 180 pictures of alpine plants in water-colours.	» 25.—
Die Alpenblumen (« Flore alpine », traduite en allemand).	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 80 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui ait jamais été publié sur le sujet.	» 30.—
Champs et bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier (suite du précédent)	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines.	» 15.—
Plantes et santé, publié en 1917. 2 ^e édition 1923, illustrée.	» 8.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs.	» 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum), un volume in-12. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes.	» 5.—

N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.

Les prix indiqués pour les publications
s'entendent en argent suisse exclusivement.
